BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HÌNH HỌC

10



NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

http://sachviet.edu.vn

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRẦN VĂN HẠO (Tổng Chủ biên)
NGUYỄN MỘNG HY (Chủ biên)
NGUYỄN VĂN ĐOÀNH – TRẦN ĐỨC HUYÊN

HÌNH HỌC 10

(Tái bản lần thứ nhất)

Scanned by hocmai.vn

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

http://sachviet.edu.vn

Kí hiệu dùng trong sách

Hoạt động của học sinh trên lớp

Scanned by hocmai.vn

Bản quyền thuộc Nhà xuất bản Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo

692-2006/CXB/381-1530/GD

Mã số : CH002T7

http://sachviet.edu.vn

CHƯƠNG I

VECTƠ

- Vectơ
- Tổng và hiệu của hai vectơ
- Tích của vectơ với một số
- Toạ độ của vectơ và toạ độ của điểm



Trong vật lí ta thường gặp các đại lượng có hướng như lực, vận tốc, ... Người ta dùng vectơ để biểu diễn các đại lượng đó.

http://sachviet.edu.vn

§1. CÁC ĐỊNH NGHĨA

1. Khái niệm vectơ



Hình 1.1

Các mũi tên trong hình 1.1 biểu diễn hướng chuyển động của ôtô và máy bay.

Cho đoạn thẳng AB. Nếu ta chọn điểm A làm *điểm đầu*, điểm B làm *điểm cuối* thì *đoạn thẳng AB* có hướng từ A đến B. Khi đó ta nói AB là một *đoạn thẳng có hướng*.

Định nghĩa

Vectơ là một đoạn thẳng có hướng.

Vectơ có điểm đầu A, điểm cuối B được kí hiệu là $\overrightarrow{AB}$ và đọc là "vectơ AB". Để vẽ vectơ $\overrightarrow{AB}$ ta vẽ đoạn thẳng AB và đánh dấu mũi tên ở đầu mút B (h.1.2a).

Vectơ còn được kí hiệu là $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{x}$, $\vec{y}$, ... khi không cần chỉ rõ điểm đầu và điểm cuối của nó (h.1.2b).



Hình 1.2

1 Với hai điểm A, B phân biệt ta có được bao nhiêu vectơ có điểm đầu và điểm cuối là A hoặc B.

http://sachviet.edu.vn

2. Vectơ cùng phương, vectơ cùng hướng

Đường thẳng đi qua điểm đầu và điểm cuối của một vectơ được gọi là *giá* của vectơ đó.

▲2 Hãy nhận xét về vị trí tương đối của các giá của các cặp vectơ sau : $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$, $\overrightarrow{PQ}$ và $\overrightarrow{RS}$, $\overrightarrow{EF}$ và $\overrightarrow{PQ}$ (h.1.3).



Hình 1.3

> ***Định nghĩa***
>
> *Hai vectơ được gọi là cùng phương nếu giá của chúng song song hoặc trùng nhau.*

Trên hình 1.3, hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng phương và có cùng hướng đi từ trái sang phải. Ta nói $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ là *hai vectơ cùng hướng*. Hai vectơ $\overrightarrow{PQ}$ và $\overrightarrow{RS}$ cùng phương nhưng có hướng ngược nhau. Ta nói hai vectơ $\overrightarrow{PQ}$ và $\overrightarrow{RS}$ là *hai vectơ ngược hướng*.

Như vậy, nếu hai vectơ cùng phương thì chúng chỉ có thể cùng hướng hoặc ngược hướng.

Nhận xét. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương.

Thật vậy, nếu hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương thì hai đường thẳng AB và AC song song hoặc trùng nhau. Vì chúng có chung điểm A nên chúng phải trùng nhau. Vậy ba điểm A, B, C thẳng hàng.

http://sachviet.edu.vn

Ngược lại, nếu ba điểm A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ có giá trùng nhau nên chúng cùng phương.

3 Khẳng định sau đúng hay sai :

Nếu ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng thì hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng hướng.

3. Hai vectơ bằng nhau

Mỗi vectơ có một *độ dài*, đó là khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối của vectơ đó. Độ dài của $\overrightarrow{AB}$ được kí hiệu là $|\overrightarrow{AB}|$, như vậy $|\overrightarrow{AB}| = AB$.

Vectơ có độ dài bằng 1 gọi là *vectơ đơn vị*.

Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ được gọi là *bằng nhau* nếu chúng cùng hướng và có cùng độ dài, kí hiệu $\vec{a} = \vec{b}$.

Chú ý. Khi cho trước vectơ $\vec{a}$ và điểm O, thì ta luôn tìm được một điểm A duy nhất sao cho $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$.

4 Gọi O là tâm hình lục giác đều $ABCDEF$. Hãy chỉ ra các vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{OA}$.

4. Vectơ - không

Ta biết rằng mỗi vectơ có một điểm đầu và một điểm cuối và hoàn toàn được xác định khi biết điểm đầu và điểm cuối của nó.

Bây giờ với một điểm A bất kì ta quy ước có một *vectơ đặc biệt* mà điểm đầu và điểm cuối đều là A. Vectơ này được kí hiệu là $\overrightarrow{AA}$ và gọi là *vectơ - không*.

Vectơ $\overrightarrow{AA}$ nằm trên mọi đường thẳng đi qua A, vì vậy ta quy ước vectơ - không cùng phương, cùng hướng với mọi vectơ. Ta cũng quy ước rằng $|\overrightarrow{AA}| = 0$. Do đó có thể coi mọi vectơ - không đều bằng nhau. Ta kí hiệu vectơ - không là $\vec{0}$. Như vậy $\vec{0} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{BB} = ...$ với mọi điểm A, B...

http://sachviet.edu.vn

Câu hỏi và bài tập

1. Cho ba vectơ $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đều khác vectơ $\vec{0}$. Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Nếu hai vectơ $\vec{a}, \vec{b}$ cùng phương với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

b) Nếu $\vec{a}, \vec{b}$ cùng ngược hướng với $\vec{c}$ thì $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng.

2. Trong hình 1.4, hãy chỉ ra các vectơ cùng phương, cùng hướng, ngược hướng và các vectơ bằng nhau.



Hình 1.4

3. Cho tứ giác $ABCD$. Chứng minh rằng tứ giác đó là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

4. Cho lục giác đều $ABCDEF$ có tâm O.

a) Tìm các vectơ khác $\vec{0}$ và cùng phương với $\overrightarrow{OA}$;

b) Tìm các vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{AB}$.

http://sachviet.edu.vn

§2. TỔNG VÀ HIỆU CỦA HAI VECTƠ

1. Tổng của hai vectơ



Hình 1.5

Trên hình 1.5, hai người đi dọc hai bên bờ kênh và cùng kéo một con thuyền với hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$. Hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ tạo nên hợp lực $\vec{F}$ là tổng của hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$, làm thuyền chuyển động.

Định nghĩa

*Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Lấy một điểm A tuỳ ý, vẽ $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ và $\overrightarrow{BC} = \vec{b}$. Vectơ $\overrightarrow{AC}$ được gọi là **tổng** của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Ta kí hiệu tổng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là $\vec{a} + \vec{b}$. Vậy $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$ (h.1.6).*

*Phép toán tìm tổng của hai vectơ còn được gọi là **phép cộng vectơ**.*



Hình 1.6

http://sachviet.edu.vn

2. Quy tắc hình bình hành

Nếu ABCD là hình bình hành thì $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$.



Hình 1.7

Trên hình 1.5, hợp lực của hai lực $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ là lực $\vec{F}$ được xác định bằng quy tắc hình bình hành.

3. Tính chất của phép cộng các vectơ

Với ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ tuỳ ý ta có

$\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$ (tính chất giao hoán) ;

$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$ (tính chất kết hợp) ;

$\vec{a} + \vec{0} = \vec{0} + \vec{a} = \vec{a}$ (tính chất của vectơ - không).

Hình 1.8 minh hoạ cho các tính chất trên.



Hình 1.8

1 Hãy kiểm tra các tính chất của phép cộng trên hình 1.8.

http://sachviet.edu.vn

4. Hiệu của hai vectơ



a) Vectơ đối

▲2 Vẽ hình bình hành $ABCD$. Hãy nhận xét về độ dài và hướng của hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$.

Cho vectơ $\vec{a}$. Vectơ có cùng độ dài và ngược hướng với $\vec{a}$ được gọi là *vectơ đối* của vectơ $\vec{a}$, kí hiệu là $-\vec{a}$.

Mỗi vectơ đều có vectơ đối, chẳng hạn vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$ là $\overrightarrow{BA}$, nghĩa là $-\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{BA}$.

Đặc biệt, vectơ đối của vectơ $\vec{0}$ là vectơ $\vec{0}$.

Ví dụ 1. Nếu D, E, F lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC (h.1.9), khi đó ta có

$\overrightarrow{EF} = -\overrightarrow{DC}$,

$\overrightarrow{BD} = -\overrightarrow{EF}$,

$\overrightarrow{EA} = -\overrightarrow{EC}$.



Hình 1.9

▲3 Cho $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{0}$. Hãy chứng tỏ $\overrightarrow{BC}$ là vectơ đối của $\overrightarrow{AB}$.

b) Định nghĩa hiệu của hai vectơ

Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Ta gọi hiệu của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là vectơ $\vec{a} + (-\vec{b})$, kí hiệu $\vec{a} - \vec{b}$.

Như vậy

$$\vec{a} - \vec{b} = \vec{a} + (-\vec{b}).$$

http://sachviet.edu.vn

Từ định nghĩa hiệu của hai vectơ, suy ra

Với ba điểm O, A, B tuỳ ý ta có $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$ *(h.1.10).*



Hình 1.10

4 Hãy giải thích vì sao hiệu của hai vectơ $\overrightarrow{OB}$ và $\overrightarrow{OA}$ là vectơ $\overrightarrow{AB}$.

☞ ***Chú ý.*** 1) Phép toán tìm hiệu của hai vectơ còn được gọi là *phép trừ* vectơ.

2) Với ba điểm tuỳ ý A, B, C ta luôn có :

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$ (quy tắc ba điểm) ;

$\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$ (quy tắc trừ).

Thực chất hai quy tắc trên được suy ra từ phép cộng vectơ.

Ví dụ 2. Với bốn điểm bất kì A, B, C, D ta luôn có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

Thật vậy, lấy một điểm O tuỳ ý ta có

$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{OD} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{CB}$.

5. Áp dụng

a) *Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi* $\overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}$.

b) *Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi* $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}$.

CHỨNG MINH

b) Trọng tâm G của tam giác ABC nằm trên trung tuyến AI. Lấy D là điểm đối xứng với G qua I. Khi đó $BGCD$ là hình bình hành và G là trung điểm của đoạn thẳng AD. Suy ra $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GD}$ và $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$. Ta có

$\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.



Hình 1.11

http://sachviet.edu.vn

Ngược lại, giả sử $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\vec{0}$. Vẽ hình bình hành $BGCD$ có I là giao điểm của hai đường chéo. Khi đó $\overrightarrow{GB}+\overrightarrow{GC}=\overrightarrow{GD}$, suy ra $\overrightarrow{GA}+\overrightarrow{GD}=\vec{0}$ nên G là trung điểm của đoạn thẳng AD. Do đó ba điểm A, G, I thẳng hàng, $GA = 2GI$, điểm G nằm giữa A và I. Vậy G là trọng tâm của tam giác ABC.

Câu hỏi và bài tập

1. Cho đoạn thẳng AB và điểm M nằm giữa A và B sao cho $AM > MB$. Vẽ các vectơ $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{MA}-\overrightarrow{MB}$.

2. Cho hình bình hành $ABCD$ và một điểm M tuỳ ý. Chứng minh rằng $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MC}=\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MD}$.

3. Chứng minh rằng đối với tứ giác $ABCD$ bất kì ta luôn có

a) $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{CD}+\overrightarrow{DA}=\vec{0}$;

b) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}=\overrightarrow{CB}-\overrightarrow{CD}$.

4. Cho tam giác ABC. Bên ngoài của tam giác vẽ các hình bình hành $ABIJ$, $BCPQ$, $CARS$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{RJ}+\overrightarrow{IQ}+\overrightarrow{PS}=\vec{0}$.

5. Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ dài của các vectơ $\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}$ và $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}$.

6. Cho hình bình hành $ABCD$ có tâm O. Chứng minh rằng

a) $\overrightarrow{CO}-\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{BA}$;

b) $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}=\overrightarrow{DB}$;

c) $\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DB}=\overrightarrow{OD}-\overrightarrow{OC}$;

d) $\overrightarrow{DA}-\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=\vec{0}$.

7. Cho $\vec{a}$, $\vec{b}$ là hai vectơ khác $\vec{0}$. Khi nào có đẳng thức

a) $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}|+|\vec{b}|$;

b) $|\vec{a}+\vec{b}|=|\vec{a}-\vec{b}|$.

8. Cho $|\vec{a}+\vec{b}|=0$. So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

9. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}$ khi và chỉ khi trung điểm của hai đoạn thẳng AD và BC trùng nhau.

10. Cho ba lực $\overrightarrow{F_1}=\overrightarrow{MA}$, $\overrightarrow{F_2}=\overrightarrow{MB}$ và $\overrightarrow{F_3}=\overrightarrow{MC}$ cùng tác động vào một vật tại điểm M và vật đứng yên. Cho biết cường độ của $\overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{F_2}$ đều là 100 N và $\widehat{AMB}=60^o$. Tìm cường độ và hướng của lực $\overrightarrow{F_3}$.

http://sachviet.edu.vn

Bài đọc thêm

Thuyền buồm chạy ngược chiều gió

Thông thường người ta vẫn nghĩ rằng gió thổi về hướng nào thì sẽ đẩy thuyền buồm về hướng đó. Trong thực tế con người đã nghiên cứu tìm cách lợi dụng sức gió làm cho thuyền buồm chạy ngược chiều gió. Vậy người ta đã làm như thế nào để thực hiện được điều tưởng chừng như vô lí đó ?

Nói một cách chính xác thì người ta có thể làm cho thuyền chuyển động theo một góc nhọn, gần bằng $\frac{1}{2}$ góc vuông đối với chiều gió thổi. Chuyển động này được thực hiện theo đường dích dắc nhằm tới hướng cần đến của mục tiêu.

Để làm được điều đó ta đặt thuyền theo hướng TT' và đặt buồm theo phương BB' như hình vẽ.



Hình 1.12

Khi đó gió thổi tác động lên mặt buồm một lực. Tổng hợp lực là lực $\vec{f}$ có điểm đặt ở chính giữa buồm. Lực $\vec{f}$ được phân tích thành hai lực : lực $\vec{p}$ vuông góc với cánh buồm BB' và lực $\vec{q}$ theo chiều dọc cánh buồm. Ta có $\vec{f} = \vec{p} + \vec{q}$. Lực $\vec{q}$ này không đẩy buồm đi đâu cả vì lực cản của gió đối với buồm không đáng kể. Lúc đó chỉ còn lực $\vec{p}$ đẩy buồm dưới một góc vuông. Như vậy khi có gió thổi, luôn luôn có một lực $\vec{p}$ vuông góc với mặt phẳng BB' của buồm. Lực $\vec{p}$ này được phân tích thành lực $\vec{r}$ vuông góc với sống thuyền và lực $\vec{s}$ dọc theo sống thuyền TT' hướng về mũi thuyền. Khi đó ta có $\vec{p} = \vec{s} + \vec{r}$. Lực $\vec{r}$ rất nhỏ so với sức cản rất lớn của nước, do thuyền buồm có sống thuyền rất sâu. Chỉ còn lực $\vec{s}$ hướng về phía trước dọc theo sống thuyền đẩy thuyền đi một góc nhọn ngược với chiều gió thổi. Bằng cách đổi hướng thuyền theo con đường dích dắc, thuyền có thể đi tới đích theo hướng ngược chiều gió mà không cần lực đẩy.

http://sachviet.edu.vn

§3. TÍCH CỦA VECTƠ VỚI MỘT SỐ

1 Cho vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$. Xác định độ dài và hướng của vectơ $\vec{a} + \vec{a}$.

1.

Định nghĩa

Cho số $k \neq 0$ và vectơ $\vec{a} \neq \vec{0}$. Tích của vectơ $\vec{a}$ với số k là một vectơ, kí hiệu là $k\vec{a}$, cùng hướng với $\vec{a}$ nếu $k > 0$, ngược hướng với $\vec{a}$ nếu $k < 0$ và có độ dài bằng $|k||\vec{a}|$.

Ta quy ước $0\vec{a} = \vec{0}$, $k\vec{0} = \vec{0}$.

Người ta còn gọi tích của vectơ với một số là *tích của một số với một vectơ.*

Ví dụ 1. Cho G là trọng tâm của tam giác ABC, D và E lần lượt là trung điểm của BC và AC. Khi đó ta có (h1.13)

$\overrightarrow{GA} = (-2)\overrightarrow{GD}$,

$\overrightarrow{AD} = 3\overrightarrow{GD}$,

$\overrightarrow{DE} = \left(-\frac{1}{2}\right)\overrightarrow{AB}$.



Hình 1.13

2. Tính chất

Với hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bất kì, với mọi số h và k, ta có

$k(\vec{a}+\vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$;

$(h+k)\vec{a} = h\vec{a} + k\vec{a}$;

$h(k\vec{a}) = (hk)\vec{a}$;

$1.\vec{a} = \vec{a}$, $(-1).\vec{a} = -\vec{a}$.

2 Tìm vectơ đối của các vectơ $k\vec{a}$ và $3\vec{a} - 4\vec{b}$.

http://sachviet.edu.vn

3. Trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác

a) Nếu I là trung điểm của đoạn thẳng AB thì với mọi điểm M ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}=2\overrightarrow{MI}$.

b) Nếu G là trọng tâm của tam giác ABC thì với mọi điểm M ta có $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+\overrightarrow{MC}=3\overrightarrow{MG}$.

▲3 Hãy sử dụng mục 5 của §2 để chứng minh các khẳng định trên.

4. Điều kiện để hai vectơ cùng phương

Điều kiện cần và đủ để hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ $(\vec{b}\neq\vec{0})$ cùng phương là có một số k để $\vec{a}=k\vec{b}$.

Thật vậy, nếu $\vec{a}=k\vec{b}$ thì hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương.

Ngược lại, giả sử $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương. Ta lấy $k=\dfrac{|\vec{a}|}{|\vec{b}|}$ nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng và lấy $k=-\dfrac{|\vec{a}|}{|\vec{b}|}$ nếu $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng. Khi đó ta có $\vec{a}=k\vec{b}$.

Nhận xét. Ba điểm phân biệt A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi có số k khác 0 để $\overrightarrow{AB}=k\overrightarrow{AC}$.

5. Phân tích một vectơ theo hai vectơ không cùng phương

Cho $\vec{a}=\overrightarrow{OA}, \vec{b}=\overrightarrow{OB}$ là hai vectơ không cùng phương và $\vec{x}=\overrightarrow{OC}$ là một vectơ tùy ý. Kẻ $CA' \,//\, OB$ và $CB' \,//\, OA$ (h. 1.14). Khi đó $\vec{x}=\overrightarrow{OC}=\overrightarrow{OA'}+\overrightarrow{OB'}$. Vì $\overrightarrow{OA'}$ và $\vec{a}$ là hai vectơ cùng phương nên có số h để $\overrightarrow{OA'}=h\vec{a}$. Vì $\overrightarrow{OB'}$ và $\vec{b}$ cùng phương nên có số k để $\overrightarrow{OB'}=k\vec{b}$.

Vậy $\vec{x}=h\vec{a}+k\vec{b}$.



Hình 1.14

http://sachviet.edu.vn

Khi đó ta nói vectơ $\vec{x}$ được phân tích (hay còn được gọi là *biểu thị*) theo hai vectơ không cùng phương $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Một cách tổng quát người ta chứng minh được mệnh đề quan trọng sau đây :

Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương. Khi đó mọi vectơ $\vec{x}$ đều phân tích được một cách duy nhất theo hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$, nghĩa là có duy nhất cặp số h, k sao cho $\vec{x} = h\vec{a} + k\vec{b}$.

Bài toán sau cho ta cách phân tích trong một số trường hợp cụ thể.

Bài toán. Cho tam giác ABC với trọng tâm G. Gọi I là trung điểm của đoạn AG và K là điểm trên cạnh AB sao cho $AK = \frac{1}{5}AB$.

a) Hãy phân tích $\overrightarrow{AI}, \overrightarrow{AK}, \overrightarrow{CI}, \overrightarrow{CK}$ theo $\vec{a} = \overrightarrow{CA}, \vec{b} = \overrightarrow{CB}$;

b) Chứng minh ba điểm C, I, K thẳng hàng.

GIẢI

a) Gọi AD là trung tuyến của tam giác ABC (h. 1.15). Ta có

$$\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD} - \overrightarrow{CA} = \frac{1}{2}\vec{b} - \vec{a}.$$

Do đó

$$\overrightarrow{AI} = \frac{1}{2}\overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{6}\vec{b} - \frac{1}{3}\vec{a};$$

$$\overrightarrow{AK} = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB} = \frac{1}{5}(\overrightarrow{CB} - \overrightarrow{CA}) = \frac{1}{5}(\vec{b} - \vec{a});$$

$$\overrightarrow{CI} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AI} = \vec{a} + \frac{1}{6}\vec{b} - \frac{1}{3}\vec{a} = \frac{1}{6}\vec{b} + \frac{2}{3}\vec{a};$$

$$\overrightarrow{CK} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AK} = \vec{a} + \frac{1}{5}\vec{b} - \frac{1}{5}\vec{a} = \frac{1}{5}\vec{b} + \frac{4}{5}\vec{a}.$$



Hình 1.15

b) Từ tính toán trên ta có $\overrightarrow{CK} = \frac{6}{5}\overrightarrow{CI}$. Vậy ba điểm C, I, K thẳng hàng.

http://sachviet.edu.vn

Câu hỏi và bài tập

1. Cho hình bình hành $ABCD$. Chứng minh rằng :

$$\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{AD}=2\overrightarrow{AC}.$$

2. Cho AK và BM là hai trung tuyến của tam giác ABC. Hãy phân tích các vectơ $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CA}$ theo hai vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{AK}$, $\vec{v}=\overrightarrow{BM}$.

3. Trên đường thẳng chứa cạnh BC của tam giác ABC lấy một điểm M sao cho $\overrightarrow{MB}=3\overrightarrow{MC}$. Hãy phân tích vectơ $\overrightarrow{AM}$ theo hai vectơ $\vec{u}=\overrightarrow{AB}$ và $\vec{v}=\overrightarrow{AC}$.

4. Gọi AM là trung tuyến của tam giác ABC và D là trung điểm của đoạn AM. Chứng minh rằng

a) $2\overrightarrow{DA}+\overrightarrow{DB}+\overrightarrow{DC}=\vec{0}$;

b) $2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=4\overrightarrow{OD}$, với O là điểm tuỳ ý.

5. Gọi M và N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD của tứ giác $ABCD$. Chứng minh rằng :

$$2\overrightarrow{MN}=\overrightarrow{AC}+\overrightarrow{BD}=\overrightarrow{BC}+\overrightarrow{AD}.$$

6. Cho hai điểm phân biệt A và B. Tìm điểm K sao cho

$$3\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\vec{0}.$$

7. Cho tam giác ABC. Tìm điểm M sao cho $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB}+2\overrightarrow{MC}=\vec{0}$.

8. Cho lục giác $ABCDEF$. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác MPR và NQS có cùng trọng tâm.

9. Cho tam giác đều ABC có O là trọng tâm và M là một điểm tuỳ ý trong tam giác. Gọi D, E, F lần lượt là chân đường vuông góc hạ từ M đến BC, AC, AB. Chứng minh rằng

$$\overrightarrow{MD}+\overrightarrow{ME}+\overrightarrow{MF}=\frac{3}{2}\overrightarrow{MO}.$$

http://sachviet.edu.vn

Bạn có biết

Tỉ lệ vàng

Ơ-clit *(Euclide)*, nhà toán học của mọi thời đại đã từng nói đến "tỉ lệ vàng" trong tác phẩm bất hủ của ông mang tên "Những nguyên tắc cơ bản". Theo Ơ-clit, điểm *I* trên đoạn *AB* được gọi là điểm *chia đoạn AB theo tỉ lệ vàng* nếu thoả mãn

$$\frac{AI}{IB} = \frac{AB}{AI}. \qquad (1)$$



Hình 1.16

Đặt $x = \frac{AI}{IB} = \frac{AB}{AI}$ ta có $\overrightarrow{AB} = x\overrightarrow{AI}$ và $\overrightarrow{AI} = x\overrightarrow{IB}$. Số x đó được gọi là *tỉ lệ vàng* và điểm *I* được gọi là *điểm vàng* của đoạn *AB*.

Để tính x, ta có thể đặt $IB = 1$. Từ (1) ta có

$$\frac{x}{1} = \frac{x+1}{x}, \qquad \text{hay} \qquad x^2 - x - 1 = 0,$$

tức là $$x = \frac{1+\sqrt{5}}{2} = 1{,}61803.$$

Với tỉ lệ vàng người ta có thể tạo nên một hình chữ nhật đẹp, cân đối và gây hứng thú cho nhiều nhà hội hoạ kiến trúc. Ví dụ, khi đến tham quan đền Pác-tê-nông ở A-ten (Hi Lạp) người ta thấy kích thước các hình hình học trong đền phần lớn chịu ảnh hưởng của tỉ lệ vàng. Nhà tâm lí học người Đức Phít-nê *(Fichner)* đã quan sát và đo hàng nghìn đồ vật thường dùng trong đời sống như ô cửa sổ, trang giấy viết, bìa sách... và so sánh kích thước giữa chiều dài và chiều ngang của chúng thì thấy tỉ số gần bằng tỉ lệ vàng.



Hình1.17. Đền Pác-tê-nông và đường nét kiến trúc của nó.

http://sachviet.edu.vn

Để dựng điểm vàng I của đoạn $AB = a$ ta làm như sau :

Vẽ tam giác ABC vuông tại B, với $BC = \frac{a}{2}$. Đường tròn tâm C bán kính $\frac{a}{2}$ cắt AC tại E. Đường tròn tâm A bán kính AE cắt AB tại I.

Ta có $AC = \frac{a\sqrt{5}}{2}$ và $AE = AI = \frac{a}{2}(\sqrt{5}-1)$. Do đó $\frac{AB}{AI} = \frac{a}{\frac{a}{2}(\sqrt{5}-1)} = \frac{\sqrt{5}+1}{2}$.



Hình 1.18



Hình 1.19

Sử dụng điểm vàng I ta có thể dựng được góc 72^0, từ đó dựng được ngũ giác đều cũng như ngôi sao năm cánh như sau :

Ta dựng đường tròn tâm I bán kính IA cắt trung trực của IB tại F ta được $\overset{\frown}{FAB} = 36^0$ và $\overset{\frown}{ABF} = 72^0$ (h.1.18).

Một ngũ giác đều nội tiếp đường tròn trên có hai đỉnh liên tiếp là F và điểm xuyên tâm đối A' của A. Từ đó ta dựng được ngay ba đỉnh còn lại của ngũ giác đều.

Cần lưu ý rằng trên ngôi sao năm cánh trong hình 1.19 thì tỉ số $\frac{AI}{IK} = \frac{AK}{AI}$ chính là tỉ lệ vàng. Ngôi sao vàng năm cánh của Quốc kì nước ta được dựng theo tỉ số này.

http://sachviet.edu.vn

§4. HỆ TRỤC TOẠ ĐỘ



Với mỗi cặp số chỉ kinh độ và vĩ độ người ta xác định được một điểm trênTrái Đất.

1. Trục và độ dài đại số trên trục

a) Trục toạ độ (hay gọi tắt là *trục*) là một đường thẳng trên đó đã xác định một điểm O gọi là *điểm gốc* và một vectơ đơn vị $\vec{e}$.

Ta kí hiệu trục đó là $(O\ ;\ \vec{e}\ )$ (h.1.20)

Hình 1.20

b) Cho M là một điểm tuỳ ý trên trục $(O\ ;\ \vec{e}\ )$. Khi đó có duy nhất một số k sao cho $\overrightarrow{OM} = k\vec{e}$. *Ta gọi số k đó là toạ độ của điểm M đối với trục đã cho.*

http://sachviet.edu.vn

c) Cho hai điểm A và B trên trục $(O\ ;\ \vec{e})$. Khi đó có duy nhất số a sao cho $\overrightarrow{AB} = a\vec{e}$. Ta gọi số a đó là *độ dài đại số của vectơ* $\overrightarrow{AB}$ *đối với trục đã cho* và kí hiệu $a = \overline{AB}$.

Nhận xét. Nếu $\overrightarrow{AB}$ cùng hướng với $\vec{e}$ thì $\overline{AB} = AB$, còn nếu $\overrightarrow{AB}$ ngược hướng với $\vec{e}$ thì $\overline{AB} = -AB$.

Nếu hai điểm A và B trên trục $(O\ ;\ \vec{e})$ có toạ độ lần lượt là a và b thì $\overline{AB} = b - a$.

2. Hệ trục toạ độ

Trong mục này ta sẽ xây dựng khái niệm hệ trục toạ độ để xác định vị trí của điểm và của vectơ trên mặt phẳng.

1 Hãy tìm cách xác định vị trí quân xe và quân mã trên bàn cờ vua (h.1.21)

Hình 1.21

a) Định nghĩa

Hệ trục toạ độ $(O\ ;\ \vec{i},\ \vec{j})$ *gồm hai trục* $(O\ ;\ \vec{i})$ *và* $(O\ ;\ \vec{j})$ *vuông góc với nhau. Điểm gốc O chung của hai trục gọi là* ***gốc toạ độ****. Trục* $(O\ ;\ \vec{i})$ *được gọi là* ***trục hoành*** *và kí hiệu là Ox, trục* $(O\ ;\ \vec{j})$ *được gọi là* ***trục tung*** *và kí hiệu là Oy. Các vectơ* $\vec{i}$ *và* $\vec{j}$ *là các vectơ đơn vị trên Ox và Oy và* $|\vec{i}| = |\vec{j}| = 1$*. Hệ trục toạ độ* $(O\ ;\ \vec{i},\ \vec{j})$ *còn được kí hiệu là Oxy (h.1.22).*

http://sachviet.edu.vn



a) b)

Hình 1.22

Mặt phẳng mà trên đó đã cho một hệ trục toạ độ Oxy được gọi là *mặt phẳng toạ độ Oxy* hay gọi tắt là *mặt phẳng Oxy*.

b) Toạ độ của vectơ

2 Hãy phân tích các vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$ theo hai vectơ $\vec{i}$ và $\vec{j}$ trong hình (h.1.23)



Hình 1.23

Trong mặt phẳng Oxy cho một vectơ $\vec{u}$ tuỳ ý. Vẽ $\overrightarrow{OA} = \vec{u}$ và gọi A_1, A_2 lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên Ox và Oy (h.1.24). Ta có $\overrightarrow{OA} = \overrightarrow{OA_1} + \overrightarrow{OA_2}$ và cặp số duy nhất $(x ; y)$ để $\overrightarrow{OA_1} = x\vec{i}$, $\overrightarrow{OA_2} = y\vec{j}$. Như vậy $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$.

http://sachviet.edu.vn

Cặp số $(x\,;\,y)$ duy nhất đó được gọi là *toạ độ của vectơ* $\vec{u}$ đối với hệ toạ độ Oxy và viết $\vec{u} = (x\,;\,y)$ hoặc $\vec{u}\,(x\,;\,y)$. Số thứ nhất x gọi là *hoành độ*, số thứ hai y gọi là *tung độ* của vectơ $\vec{u}$.



Hình 1.24

Như vậy

$$\vec{u} = (x\,;\,y) \Leftrightarrow \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

Nhận xét. Từ định nghĩa toạ độ của vectơ, ta thấy *hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.*

Nếu $\vec{u} = (x\,;\,y)$, $\vec{u}' = (x'\,;\,y')$ thì

$$\vec{u} = \vec{u}' \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' \\ y = y' \end{cases}$$

Như vậy, mỗi vectơ được hoàn toàn xác định khi biết toạ độ của nó.

c) Toạ độ của một điểm

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho một điểm M tuỳ ý. Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{OM}$ đối với hệ trục Oxy được gọi là *toạ độ của điểm M* đối với hệ trục đó (h.1.25).

Như vậy, cặp số $(x\,;\,y)$ là toạ độ của điểm M khi và chỉ khi $\overrightarrow{OM} = (x\,;\,y)$. Khi đó ta viết $M(x\,;\,y)$ hoặc $M = (x\,;\,y)$. Số x được gọi là *hoành độ*, còn số y được gọi là *tung độ* của điểm M. Hoành độ của điểm M còn được kí hiệu là x_M, tung độ của điểm M còn được kí hiệu là y_M.



Hình 1.25

$$M = (x\,;\,y) \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$$

Chú ý rằng, nếu $MM_1 \perp Ox$, $MM_2 \perp Oy$ thì $x = \overline{OM_1}$, $y = \overline{OM_2}$.

http://sachviet.edu.vn

▲3 Tìm toạ độ của các điểm A, B, C trong hình 1.26. Cho ba điểm $D(-2\,;\,3)$, $E(0\,;\,-4)$, $F(3\,;\,0)$. Hãy vẽ các điểm D, E, F trên mặt phẳng Oxy.



Hình 1.26

d) Liên hệ giữa toạ độ của điểm và toạ độ của vectơ trong mặt phẳng

Cho hai điểm $A(x_A\,;\,y_A)$ và $B(x_B\,;\,y_B)$. Ta có

$$\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A\ ;\ y_B - y_A).$$

▲4 Hãy chứng minh công thức trên.

3. Toạ độ của các vectơ $\vec{u}+\vec{v}$, $\vec{u}-\vec{v}$, $k\vec{u}$

Ta có các công thức sau :

Cho $\vec{u} = (u_1\,;\,u_2)$, $\vec{v} = (v_1\ ;\ v_2)$. Khi đó :

$\vec{u}+\vec{v} = (u_1 + v_1\,;\,u_2 + v_2)$;

$\vec{u}-\vec{v} = (u_1 - v_1\,;\,u_2 - v_2)$;

$k\vec{u} = (ku_1\,;\,ku_2),\ k \in \mathbb{R}$.

http://sachviet.edu.vn

Ví dụ 1. Cho $\vec{a} = (1 ; -2)$, $\vec{b} = (3 ; 4)$, $\vec{c} = (5 ; -1)$. Tìm toạ độ vectơ $\vec{u} = 2\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$.

Ta có $2\vec{a} = (2 ; -4)$, $2\vec{a} + \vec{b} = (5 ; 0)$, $2\vec{a} + \vec{b} - \vec{c} = (0 ; 1)$.

Vậy $\vec{u} = (0 ; 1)$.

Ví dụ 2. Cho $\vec{a} = (1 ; -1)$, $\vec{b} = (2 ; 1)$. Hãy phân tích vectơ $\vec{c} = (4 ; -1)$ theo $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

Giả sử $\vec{c} = k\vec{a} + h\vec{b} = (k + 2h ; -k + h)$

Ta có $\begin{cases} k + 2h = 4 \\ -k + h = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} k = 2 \\ h = 1. \end{cases}$

Vậy $\vec{c} = 2\vec{a} + \vec{b}$.

Nhận xét. *Hai vectơ* $\vec{u} = (u_1 ; u_2)$, $\vec{v} = (v_1 ; v_2)$ *với* $\vec{v} \neq \vec{0}$ *cùng phương khi và chỉ khi có một số* k *sao cho* $u_1 = kv_1$ *và* $u_2 = kv_2$.

4. Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng. Toạ độ của trọng tâm tam giác

a) Cho đoạn thẳng AB có $A(x_A ; y_A)$, $B(x_B ; y_B)$. Ta dễ dàng chứng minh được toạ độ trung điểm $I(x_I ; y_I)$ của đoạn thẳng AB là :

$$x_I = \frac{x_A + x_B}{2}, \quad y_I = \frac{y_A + y_B}{2}.$$

5. Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC. Hãy phân tích vectơ $\overrightarrow{OG}$ theo ba vectơ $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$ và $\overrightarrow{OC}$. Từ đó hãy tính toạ độ của G theo toạ độ của A, B và C.

b) Cho tam giác ABC có $A(x_A ; y_A)$, $B(x_B ; y_B)$, $C(x_C ; y_C)$. Khi đó toạ độ của trọng tâm $G(x_G ; y_G)$ của tam giác ABC được tính theo công thức :

$$x_G = \frac{x_A + x_B + x_C}{3}, \quad y_G = \frac{y_A + y_B + y_C}{3}.$$

http://sachviet.edu.vn

Ví dụ. Cho $A(2\ ;\ 0)$, $B(0\ ;\ 4)$, $C(1\ ;\ 3)$. Tìm toạ độ trung điểm I của đoạn thẳng AB và toạ độ của trọng tâm G của tam giác ABC.

Ta có $x_I = \dfrac{2+0}{2} = 1,$ $y_I = \dfrac{0+4}{2} = 2\ ;$

$x_G = \dfrac{2+0+1}{3} = 1,$ $y_G = \dfrac{0+4+3}{3} = \dfrac{7}{3}.$

Câu hỏi và bài tập

1. Trên trục $(O\ ;\ \vec{e}\,)$ cho các điểm A, B, M, N có toạ độ lần lượt là $-1, 2, 3, -2$.

a) Hãy vẽ trục và biểu diễn các điểm đã cho trên trục ;

b) Tính độ dài đại số của $\overline{AB}$ và $\overline{MN}$. Từ đó suy ra hai vectơ $\overline{AB}$ và $\overline{MN}$ ngược hướng.

2. Trong mặt phẳng toạ độ các mệnh đề sau đúng hay sai ?

a) $\vec{a} = (-3\ ;\ 0)$ và $\vec{i} = (1\ ;\ 0)$ là hai vectơ ngược hướng ;

b) $\vec{a} = (3\ ;\ 4)$ và $\vec{b} = (-3\ ;\ -4)$ là hai vectơ đối nhau ;

c) $\vec{a} = (5\ ;\ 3)$ và $\vec{b} = (3\ ;\ 5)$ là hai vectơ đối nhau ;

d) Hai vectơ bằng nhau khi và chỉ khi chúng có hoành độ bằng nhau và tung độ bằng nhau.

3. Tìm toạ độ của các vectơ sau :

a) $\vec{a} = 2\vec{i}$; b) $\vec{b} = -3\vec{j}$;

c) $\vec{c} = 3\vec{i} - 4\vec{j}$; d) $\vec{d} = 0,2\vec{i} + \sqrt{3}\,\vec{j}$.

4. Trong mặt phẳng Oxy. Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Toạ độ của điểm A là toạ độ của vectơ $\overrightarrow{OA}$;

b) Điểm A nằm trên trục hoành thì có tung độ bằng 0 ;

c) Điểm A nằm trên trục tung thì có hoành độ bằng 0 ;

d) Hoành độ và tung độ của điểm A bằng nhau khi và chỉ khi A nằm trên đường phân giác của góc phần tư thứ nhất.

http://sachviet.edu.vn

5. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho điểm $M(x_0 ; y_0)$.

a) Tìm toạ độ của điểm A đối xứng với M qua trục Ox ;

b) Tìm toạ độ của điểm B đối xứng với M qua trục Oy ;

c) Tìm toạ độ điểm C đối xứng với M qua gốc O.

6. Cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-1 ; -2)$, $B(3 ; 2)$, $C(4 ; -1)$. Tìm toạ độ đỉnh D.

7. Các điểm $A'(-4 ; 1)$, $B'(2 ; 4)$ và $C'(2 ; -2)$ lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA và AB của tam giác ABC. Tính toạ độ các đỉnh của tam giác ABC. Chứng minh rằng trọng tâm của các tam giác ABC và $A'B'C'$ trùng nhau.

8. Cho $\vec{a} = (2 ; -2)$, $\vec{b} = (1 ; 4)$. Hãy phân tích vectơ $\vec{c} = (5 ; 0)$ theo hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$.

http://sachviet.edu.vn

ÔN TẬP CHƯƠNG I

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Cho lục giác đều $ABCDEF$ có tâm O. Hãy chỉ ra các vectơ bằng $\overrightarrow{AB}$ có điểm đầu và điểm cuối là O hoặc các đỉnh của lục giác.

2. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều khác $\vec{0}$. Các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng hướng thì cùng phương ;

b) Hai vectơ $\vec{b}$ và $k\vec{b}$ cùng phương ;

c) Hai vectơ $\vec{a}$ và $(-2)\vec{a}$ cùng hướng ;

d) Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ ngược hướng với vectơ thứ ba khác $\vec{0}$ thì cùng phương.

3. Tứ giác $ABCD$ là hình gì nếu $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$ và $|\overrightarrow{AB}| = |\overrightarrow{BC}|$.

4. Chứng minh rằng $|\vec{a} + \vec{b}| \le |\vec{a}| + |\vec{b}|$.

5. Cho tam giác đều ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O. Hãy xác định các điểm M, N, P sao cho

a) $\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$; b) $\overrightarrow{ON} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$; c) $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OA}$.

6. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính

a) $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}|$; b) $|\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC}|$.

http://sachviet.edu.vn

7. Cho sáu điểm M, N, P, Q, R, S bất kì. Chứng minh rằng

$$\overrightarrow{MP}+\overrightarrow{NQ}+\overrightarrow{RS}=\overrightarrow{MS}+\overrightarrow{NP}+\overrightarrow{RQ}.$$

8. Cho tam giác OAB. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tìm các số m, n sao cho

a) $\overrightarrow{OM}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$;

b) $\overrightarrow{AN}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$;

c) $\overrightarrow{MN}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$;

d) $\overrightarrow{MB}=m\overrightarrow{OA}+n\overrightarrow{OB}$.

9. Chứng minh rằng nếu G và G' lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và $A'B'C'$ thì $3\overrightarrow{GG'}=\overrightarrow{AA'}+\overrightarrow{BB'}+\overrightarrow{CC'}$.

10. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, các khẳng định sau đúng hay sai ?

a) Hai vectơ đối nhau thì chúng có hoành độ đối nhau ;

b) Vectơ $\vec{a}\neq\vec{0}$ cùng phương với vectơ $\vec{i}$ nếu $\vec{a}$ có hoành độ bằng 0 ;

c) Vectơ $\vec{a}$ có hoành độ bằng 0 thì cùng phương với vectơ $\vec{j}$.

11. Cho $\vec{a}=(2\,;\,1)$, $\vec{b}=(3\,;-4)$, $\vec{c}=(-7\,;\,2)$.

a) Tìm toạ độ của vectơ $\vec{u}=3\vec{a}+2\vec{b}-4\vec{c}$;

b) Tìm toạ độ vectơ $\vec{x}$ sao cho $\vec{x}+\vec{a}=\vec{b}-\vec{c}$;

c) Tìm các số k và h sao cho $\vec{c}=k\vec{a}+h\vec{b}$.

12. Cho $\vec{u}=\frac{1}{2}\vec{i}-5\vec{j}$, $\vec{v}=m\vec{i}-4\vec{j}$.

Tìm m để $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương.

13. Trong các khẳng định sau khẳng định nào là đúng ?

a) Điểm A nằm trên trục hoành thì có hoành độ bằng 0 ;

b) P là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi hoành độ của P bằng trung bình cộng các hoành độ của A và B ;

c) Nếu tứ giác $ABCD$ là hình bình hành thì trung bình cộng các toạ độ tương ứng của A và C bằng trung bình cộng các toạ độ tương ứng của B và D.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Cho tứ giác $ABCD$. Số các vectơ khác $\vec{0}$ có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của tứ giác bằng :

(A) 4 ; (B) 6 ; (C) 8 ; (D) 12.

http://sachviet.edu.vn

2. Cho lục giác đều $ABCDEF$ có tâm O. Số các vectơ khác $\vec{0}$ cùng phương với $\overrightarrow{OC}$ có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng :

(A) 4 ; (B) 6 ; (C) 7 ; (D) 8.

3. Cho lục giác đều $ABCDEF$ có tâm O. Số các vectơ bằng vectơ $\overrightarrow{OC}$ có điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác bằng :

(A) 2 ; (B) 3 ; (C) 4 ; (D) 6.

4. Cho hình chữ nhật $ABCD$ có $AB = 3$, $BC = 4$. Độ dài của vectơ $\overrightarrow{AC}$ là :

(A) 5 ; (B) 6 ; (C) 7 ; (D) 9.

5. Cho ba điểm phân biệt A, B, C. Đẳng thức nào sau đây là đúng ?

(A) $\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{BC}$; (B) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BC}$;

(C) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CA} = \overrightarrow{CB}$; (D) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{CA}$.

6. Cho hai điểm phân biệt A và B. Điều kiện để điểm I là trung điểm của đoạn thẳng AB là :

(A) $IA = IB$; (B) $\overrightarrow{IA} = \overrightarrow{IB}$;

(C) $\overrightarrow{IA} = -\overrightarrow{IB}$; (D) $\overrightarrow{AI} = \overrightarrow{BI}$.

7. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm, I là trung điểm của đoạn thẳng BC. Đẳng thức nào sau đây là đúng ?

(A) $\overrightarrow{GA} = 2\overrightarrow{GI}$; (B) $\overrightarrow{IG} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{IA}$;

(C) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = 2\overrightarrow{GI}$; (D) $\overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GA}$.

8. Cho hình bình hành $ABCD$. Đẳng thức nào sau đây là đúng ?

(A) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{BC}$; (B) $\overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AB}$;

(C) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{BD} = 2\overrightarrow{CD}$; (D) $\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{CD}$.

9. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình bình hành $OABC$, C nằm trên Ox. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

(A) $\overrightarrow{AB}$ có tung độ khác 0 ; (B) A và B có tung độ khác nhau ;

(C) C có hoành độ bằng 0 ; (D) $x_A + x_C - x_B = 0$.

http://sachviet.edu.vn

10. Cho $\vec{u} = (3 ; -2)$, $\vec{v} = (1 ; 6)$. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

(A) $\vec{u}+\vec{v}$ và $\vec{a} = (-4 ; 4)$ ngược hướng ;

(B) $\vec{u}$ và $\vec{v}$ cùng phương ;

(C) $\vec{u}-\vec{v}$ và $\vec{b} = (6 ; -24)$ cùng hướng :

(D) $2\vec{u}+\vec{v}$ và $\vec{v}$ cùng phương.

11. Cho tam giác ABC có $A(3 ; 5)$, $B(1 ; 2)$, $C(5 ; 2)$. Trọng tâm của tam giác ABC là :

(A) $G_1(-3 ; 4)$;

(B) $G_2(4 ; 0)$;

(C) $G_3(\sqrt{2} ; 3)$;

(D) $G_4(3 ; 3)$.

12. Cho bốn điểm $A(1 ; 1)$, $B(2 ; -1)$, $C(4 ; 3)$, $D(3 ; 5)$. Chọn mệnh đề đúng :

(A) Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành ;

(B) Điểm $G(2 ; \frac{5}{3})$ là trọng tâm của tam giác BCD ;

(C) $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$;

(D) $\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AD}$ cùng phương.

13. Trong mặt phẳng Oxy cho bốn điểm $A(-5 ; -2)$, $B(-5 ; 3)$, $C(3 ; 3)$, $D(3 ; -2)$. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

(A) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng hướng ;

(B) Tứ giác $ABCD$ là hình chữ nhật ;

(C) Điểm $I(-1 ; 1)$ là trung điểm AC ;

(D) $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB} = \overrightarrow{OC}$.

14. Cho tam giác ABC. Đặt $\vec{a} = \overrightarrow{BC}$, $\vec{b} = \overrightarrow{AC}$.
Các cặp vectơ nào sau đây cùng phương ?

(A) $2\vec{a}+\vec{b}$ và $\vec{a}+2\vec{b}$;

(B) $\vec{a}-2\vec{b}$ và $2\vec{a}-\vec{b}$;

(C) $5\vec{a}+\vec{b}$ và $-10\vec{a}-2\vec{b}$;

(D) $\vec{a}+\vec{b}$ và $\vec{a}-\vec{b}$.

15. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho hình vuông $ABCD$ có gốc O là tâm của hình vuông và các cạnh của nó song song với các trục toạ độ. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

(A) $|\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}| = AB$;

(B) $\overrightarrow{OA}-\overrightarrow{OB}$ và $\overrightarrow{DC}$ cùng hướng ;

(C) $x_A = -x_C$ và $y_A = y_C$;

(D) $x_B = -x_C$ và $y_C = -y_B$.

http://sachviet.edu.vn

16. Cho $M(3 ; -4)$. Kẻ MM_1 vuông góc với Ox, MM_2 vuông góc với Oy. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

(A) $\overline{OM_1} = -3$;

(B) $\overline{OM_2} = 4$;

(C) $\overrightarrow{OM_1} - \overrightarrow{OM_2}$ có toạ độ $(-3 ; -4)$;

(D) $\overrightarrow{OM_1} + \overrightarrow{OM_2}$ có toạ độ $(3 ; -4)$.

17. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho $A(2 ; -3)$, $B(4 ; 7)$. Toạ độ trung điểm I của đoạn thẳng AB là

(A) $(6 ; 4)$;

(B) $(2 ; 10)$;

(C) $(3 ; 2)$;

(D) $(8 ; -21)$.

18. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho $A(5 ; 2)$, $B(10 ; 8)$. Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{AB}$ là

(A) $(15 ; 10)$;

(B) $(2 ; 4)$;

(C) $(5 ; 6)$;

(D) $(50 ; 16)$.

19. Cho tam giác ABC có $B(9 ; 7)$, $C(11 ; -1)$, M và N lần lượt là trung điểm của AB và AC. Toạ độ của vectơ $\overrightarrow{MN}$ là

(A) $(2 ; -8)$;

(B) $(1 ; -4)$;

(C) $(10 ; 6)$;

(D) $(5 ; 3)$.

20. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho bốn điểm $A(3 ; -2)$, $B(7 ; 1)$, $C(0 ; 1)$, $D(-8 ; -5)$.

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

(A) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ đối nhau ;

(B) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng phương nhưng ngược hướng ;

(C) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{CD}$ cùng phương và cùng hướng ;

(D) A, B, C, D thẳng hàng.

21. Cho ba điểm $A(-1 ; 5)$, $B(5 ; 5)$, $C(-1 ; 11)$. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

(A) A, B, C thẳng hàng ;

(B) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng phương ;

(C) $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ không cùng phương ;

(D) $\overrightarrow{AC}$ và $\overrightarrow{BC}$ cùng phương.

http://sachviet.edu.vn

22. Cho $\vec{a} = (3 ; -4)$, $\vec{b} = (-1 ; 2)$. Toạ độ của vectơ $\vec{a} + \vec{b}$ là

(A) $(-4 ; 6)$; (B) $(2 ; -2)$; (C) $(4 ; -6)$; (D) $(-3 ; -8)$.

23. Cho $\vec{a} = (-1 ; 2)$, $\vec{b} = (5 ; -7)$. Toạ độ của vectơ $\vec{a} - \vec{b}$ là

(A) $(6 ; -9)$; (B) $(4 ; -5)$; (C) $(-6 ; 9)$; (D) $(-5 ; -14)$.

24. Cho $\vec{a} = (-5 ; 0)$, $\vec{b} = (4 ; x)$. Hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương nếu số x là

(A) -5 ; (B) 4 ; (C) 0 ; (D) -1.

25. Cho $\vec{a} = (x ; 2)$, $\vec{b} = (-5 ; 1)$, $\vec{c} = (x ; 7)$. Vectơ $\vec{c} = 2\vec{a} + 3\vec{b}$ nếu

(A) $x = -15$; (B) $x = 3$; (C) $x = 15$; (D) $x = 5$.

26. Cho $A(1 ; 1)$, $B(-2 ; -2)$, $C(7 ; 7)$. Khẳng định nào đúng ?

(A) $G(2 ; 2)$ là trọng tâm của tam giác ABC ;

(B) Điểm B ở giữa hai điểm A và C ;

(C) Điểm A ở giữa hai điểm B và C ;

(D) Hai vectơ $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{AC}$ cùng hướng.

27. Các điểm $M(2 ; 3)$, $N(0 ; -4)$, $P(-1 ; 6)$ lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. Toạ độ đỉnh A của tam giác là :

(A) $(1 ; 5)$; (B) $(-3 ; -1)$; (C) $(-2 ; -7)$; (D) $(1 ; -10)$.

28. Cho tam giác ABC có trọng tâm là gốc toạ độ O, hai đỉnh A và B có toạ độ là $A(-2 ; 2)$, $B(3 ; 5)$. Toạ độ của đỉnh C là :

(A) $(-1 ; -7)$; (B)$(2 ; -2)$; (C) $(-3 ; -5)$; (D) $(1 ; 7)$.

29. Khẳng định nào trong các khẳng định sau là đúng ?

(A) Hai vectơ $\vec{a} = (-5 ; 0)$ và $\vec{b} = (-4 ; 0)$ cùng hướng ;

(B) Vectơ $\vec{c} = (7 ; 3)$ là vectơ đối của $\vec{d} = (-7; 3)$;

(C) Hai vectơ $\vec{u} = (4 ; 2)$ và $\vec{v} = (8 ; 3)$ cùng phương ;

(D) Hai vectơ $\vec{a} = (6 ; 3)$ và $\vec{b} = (2 ; 1)$ ngược hướng.

30. Trong hệ trục $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, toạ độ của vectơ $\vec{i} + \vec{j}$ là :

(A) $(0 ; 1)$; (B) $(-1 ; 1)$; (C) $(1 ; 0)$; (D) $(1 ; 1)$.

http://sachviet.edu.vn

Bạn có biết

Tìm hiểu về vectơ

Việc nghiên cứu vectơ và các phép toán trên các vectơ bắt nguồn từ nhu cầu của cơ học và vật lí. Trước thế kỉ XIX người ta dùng toạ độ để xác định vectơ và quy các phép toán trên các vectơ về các phép toán trên toạ độ của chúng. Chỉ vào giữa thế kỉ XIX, người ta mới xây dựng được các phép toán trực tiếp trên các vectơ như chúng ta đã nghiên cứu trong chương I. Các nhà toán học Ha-min-tơn (*W. Hamilton*), Grat-sman (*H. Grassmann*) và Gip (*J. Gibbs*) là những người đầu tiên nghiên cứu một cách có hệ thống về vectơ. Thuật ngữ "Vectơ" cũng được đưa ra từ các công trình ấy. *Vector* theo tiếng La-tinh có nghĩa là *Vật mang*. Đến đầu thế kỉ XX vectơ được hiểu là phần tử của một tập hợp nào đó mà trên đó đã cho các phép toán thích hợp để trở thành một cấu trúc gọi là không gian vectơ. Nhà toán học Vây (*Weyl*) đã xây dựng hình học Ơ-clit dựa vào không gian vectơ theo hệ tiên đề và được nhiều người tiếp nhận một cách thích thú. Đối tượng cơ bản được đưa ra trong hệ tiên đề này là *điểm* và *vectơ*. Việc xây dựng này cho phép ta có thể mở rộng số chiều của không gian một cách dễ dàng và có thể sử dụng các công cụ của lí thuyết tập hợp và ánh xạ. Đồng thời hình học có thể sử dụng những cấu trúc đại số để phát triển theo các phương hướng mới.

Vào những năm giữa thế kỉ XX, trong xu hướng hiện đại hoá chương trình phổ thông, nhiều nhà toán học trên thế giới đã vận động đưa việc giảng dạy vectơ vào trường phổ thông. Ở nước ta, vectơ và toạ độ cũng được đưa vào giảng dạy ở trường phổ thông cùng với một chương trình toán hiện đại nhằm đổi mới để nâng cao chất lượng giáo dục cho phù hợp với xu thế chung của thế giới.

http://sachviet.edu.vn

CHƯƠNG II

TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

- Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°
- Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng
- Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu thêm một phép toán mới về vectơ, đó là phép nhân vô hướng của hai vectơ. Phép nhân này cho kết quả là một số, số đó gọi là *tích vô hướng của hai vectơ*. Để có thể xác định tích vô hướng của hai vectơ ta cần đến khái niệm *giá trị lượng giác của một góc α bất kì với $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$* là mở rộng của khái niệm tỉ số lượng giác của một góc nhọn α đã biết ở lớp 9.

http://sachviet.edu.vn

§1. GIÁ TRỊ LƯỢNG GIÁC CỦA MỘT GÓC BẤT KÌ TỪ 0^o ĐẾN 180^o

1 Tam giác ABC vuông tại A có góc nhọn $\widehat{ABC} = \alpha$. Hãy nhắc lại định nghĩa các tỉ số lượng giác của góc nhọn α đã học ở lớp 9.



Hình 2.1

2 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, nửa đường tròn tâm O nằm phía trên trục hoành bán kính $R = 1$ được gọi là *nửa đường tròn đơn vị* (h.2.2). Nếu cho trước một góc nhọn α thì ta có thể xác định một điểm M duy nhất trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$. Giả sử điểm M có toạ độ $(x_0 ; y_0)$.

Hãy chứng tỏ rằng $\sin\alpha = y_0$, $\cos\alpha = x_0$, $\tan\alpha = \dfrac{y_0}{x_0}$, $\cot\alpha = \dfrac{x_0}{y_0}$.



Hình 2.2

Mở rộng khái niệm tỉ số lượng giác đối với góc nhọn cho những góc α bất kì với $0^o \le \alpha \le 180^o$, ta có định nghĩa sau đây :

http://sachviet.edu.vn

1. Định nghĩa

Với mỗi góc α ($0^o \le \alpha \le 180^o$) ta xác định một điểm M trên nửa đường tròn đơn vị (h.2.3) sao cho $\widehat{xOM} = \alpha$ và giả sử điểm M có toạ độ $M(x_0 ; y_0)$. Khi đó ta định nghĩa :



Hình 2.3

- sin của góc α là y_0, kí hiệu $\sin\alpha = y_0$;
- côsin của góc α là x_0, kí hiệu $\cos\alpha = x_0$;
- tang của góc α là $\dfrac{y_0}{x_0}$ $(x_0 \neq 0)$, kí hiệu $\tan\alpha = \dfrac{y_0}{x_0}$;
- côtang của góc α là $\dfrac{x_0}{y_0}$ $(y_0 \neq 0)$, kí hiệu $\cot\alpha = \dfrac{x_0}{y_0}$.

Các số $\sin\alpha$, $\cos\alpha$, $\tan\alpha$, $\cot\alpha$ được gọi là các *giá trị lượng giác của góc* α.

Ví dụ. Tìm các giá trị lượng giác của góc 135^o.

Lấy điểm M trên nửa đường tròn đơn vị sao cho $\widehat{xOM} = 135^o$. Khi đó ta có $\widehat{yOM} = 45^o$. Từ đó ta suy ra toạ độ của điểm M là $\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2} ; \dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ (h.2.4).

Vậy $\sin 135^o = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$; $\cos 135^o = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$\tan 135^o = -1$; $\cot 135^o = -1$.

Chú ý. • Nếu α là góc tù thì $\cos\alpha < 0$, $\tan\alpha < 0$, $\cot\alpha < 0$.

- $\tan\alpha$ chỉ xác định khi $\alpha \neq 90^o$, $\cot\alpha$ chỉ xác định khi $\alpha \neq 0^o$ và $\alpha \neq 180^o$.



Hình 2.4

http://sachviet.edu.vn

2. Tính chất

Trên hình 2.5 ta có dây cung NM song song với trục Ox và nếu $\widehat{xOM} = \alpha$ thì $\widehat{xON} = 180^\circ - \alpha$. Ta có $y_M = y_N = y_0$, $x_M = -x_N = x_0$. Do đó

$$\sin\alpha = \sin(180^\circ - \alpha)$$
$$\cos\alpha = -\cos(180^\circ - \alpha)$$
$$\tan\alpha = -\tan(180^\circ - \alpha)$$
$$\cot\alpha = -\cot(180^\circ - \alpha).$$



Hình 2.5

3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

Giá trị lượng giác của các góc bất kì có thể tìm thấy trên bảng số hoặc trên máy tính bỏ túi.

Sau đây là giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt mà chúng ta cần ghi nhớ.

Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

Giá trị lượng giác / α	0°	30°	45°	60°	90°	180°
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	−1
$\tan\alpha$	0	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	1	$\sqrt{3}$	||	0
$\cot\alpha$	||	$\sqrt{3}$	1	$\frac{1}{\sqrt{3}}$	0	||

Trong bảng, kí hiệu "||" để chỉ giá trị lượng giác không xác định.

http://sachviet.edu.vn

☞ ***Chú ý.*** Từ giá trị lượng giác của các góc đặc biệt đã cho trong bảng và tính chất trên, ta có thể suy ra giá trị lượng giác của một số góc đặc biệt khác.

Chẳng hạn :

$$\sin 120^\circ = \sin(180^\circ - 60^\circ) = \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\cos 135^\circ = \cos(180^\circ - 45^\circ) = -\cos 45^\circ = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

▲3 Tìm các giá trị lượng giác của các góc 120°, 150°.

4. Góc giữa hai vectơ

a) Định nghĩa

Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều khác vectơ $\vec{0}$. Từ một điểm O bất kì ta vẽ $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$ và $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$. Góc $\widehat{AOB}$ với số đo từ 0° đến 180° được gọi là ***góc giữa hai vectơ*** *$\vec{a}$ và $\vec{b}$. Ta kí hiệu góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là $(\vec{a}, \vec{b})$ (h.2.6). Nếu $(\vec{a}, \vec{b}) = 90^\circ$ thì ta nói rằng $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc với nhau, kí hiệu là $\vec{a} \perp \vec{b}$ hoặc $\vec{b} \perp \vec{a}$.*

b) Chú ý. Từ định nghĩa ta có $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$.



Hình 2.6

▲4 Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 0° ? Khi nào góc giữa hai vectơ bằng 180° ?

http://sachviet.edu.vn

b) Xác định độ lớn của góc khi biết giá trị lượng giác của góc đó

Sau khi mở máy và chọn đơn vị đo góc, để tính góc x khi biết các giá trị lượng giác của góc đó ta làm như ví dụ sau.

Ví dụ 2. Tìm x biết $\sin x = 0{,}3502$.

Ta ấn liên tiếp các phím sau đây :

SHIFT | sin | 0.3502 | = | SHIFT | o‘‘‘

và được kết quả là : $x \approx 20^o29'58''$.

Muốn tìm x khi biết $\cos x$, $\tan x$ ta làm tương tự như trên, chỉ thay phím sin bằng phím cos, tan.

Câu hỏi và bài tập

1. Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có :

a) $\sin A = \sin(B + C)$; b) $\cos A = -\cos(B + C)$.

2. Cho AOB là tam giác cân tại O có $OA = a$ và có các đường cao OH và AK. Giả sử $\widehat{AOH} = \alpha$. Tính AK và OK theo a và α.

3. Chứng minh rằng :

a) $\sin 105^o = \sin 75^o$;

b) $\cos 170^o = -\cos 10^o$;

c) $\cos 122^o = -\cos 58^o$.

4. Chứng minh rằng với mọi góc α ($0^o \le \alpha \le 180^o$) ta đều có $\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1$.

5. Cho góc x, với $\cos x = \frac{1}{3}$. Tính giá trị của biểu thức : $P = 3\sin^2 x + \cos^2 x$.

6. Cho hình vuông $ABCD$. Tính :

$\cos(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BA})$, $\sin(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{BD})$, $\cos(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD})$.

http://sachviet.edu.vn

§2. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ

Trong vật lí, ta biết rằng nếu có một lực $\vec{F}$ tác động lên một vật tại điểm O và làm cho vật đó di chuyển một quãng đường $s = OO'$ thì công A của lực $\vec{F}$ được tính theo công thức :



Hình 2.8

$A = |\vec{F}|.|\overrightarrow{OO'}|\cos\varphi$ (h.2.8)

trong đó $|\vec{F}|$ là cường độ của lực $\vec{F}$ tính bằng Niutơn (viết tắt là N), $|\overrightarrow{OO'}|$ là độ dài của vectơ $\overrightarrow{OO'}$ tính bằng mét (m), φ là góc giữa hai vectơ $\overrightarrow{OO'}$ và $\vec{F}$, còn công A được tính bằng Jun (viết tắt là J).

Trong toán học, giá trị A của biểu thức trên (không kể đơn vị đo) được gọi là tích vô hướng của hai vectơ $\vec{F}$ và $\overrightarrow{OO'}$.

1. Định nghĩa

*Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều khác vectơ $\vec{0}$. **Tích vô hướng** của $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là một số, kí hiệu là $\vec{a}.\vec{b}$, được xác định bởi công thức sau :*

$$\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}| . |\vec{b}|\cos(\vec{a}, \vec{b}).$$

Trường hợp ít nhất một trong hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ bằng vectơ $\vec{0}$ ta quy ước $\vec{a}.\vec{b} = 0$.

☞ ***Chú ý***

a) Với $\vec{a}$ và $\vec{b}$ khác vectơ $\vec{0}$ ta có $\vec{a}.\vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$.

b) Khi $\vec{a} = \vec{b}$ tích vô hướng $\vec{a}.\vec{a}$ được kí hiệu là $\vec{a}^2$ và số này được gọi là *bình phương vô hướng của vectơ $\vec{a}$*.

Ta có $\vec{a}^2 = |\vec{a}|.|\vec{a}|\cos 0^o = |\vec{a}|^2$.

http://sachviet.edu.vn

Ví dụ. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a và có chiều cao AH. Khi đó ta có (h.2.9)

$$\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} = a.a.\cos 60^\circ = \frac{1}{2}a^2,$$

$$\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{CB} = a.a.\cos 120^\circ = -\frac{1}{2}a^2,$$

$$\overrightarrow{AH}.\overrightarrow{BC} = \frac{a\sqrt{3}}{2}.a.\cos 90^\circ = 0.$$



Hình 2.9

2. Các tính chất của tích vô hướng

Người ta chứng minh được các tính chất sau đây của tích vô hướng :

> Với ba vectơ $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ bất kì và mọi số k ta có :
>
> $\vec{a}.\vec{b} = \vec{b}.\vec{a}$ (tính chất giao hoán) ;
>
> $\vec{a}.(\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a}.\vec{b} + \vec{a}.\vec{c}$ (tính chất phân phối) ;
>
> $(k\vec{a}).\vec{b} = k(\vec{a}.\vec{b}) = \vec{a}.(k\vec{b})$;
>
> $\vec{a}^2 \geq 0$, $\vec{a}^2 = 0 \Leftrightarrow \vec{a} = \vec{0}$.

Nhận xét. Từ các tính chất của tích vô hướng của hai vectơ ta suy ra :

> $(\vec{a}+\vec{b})^2 = \vec{a}^2 + 2\vec{a}.\vec{b} + \vec{b}^2$;
>
> $(\vec{a}-\vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a}.\vec{b} + \vec{b}^2$;
>
> $(\vec{a}+\vec{b}).(\vec{a}-\vec{b}) = \vec{a}^2 - \vec{b}^2$.

1 Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ đều khác vectơ $\vec{0}$. Khi nào thì tích vô hướng của hai vectơ đó là số dương ? Là số âm ? Bằng 0 ?

http://sachviet.edu.vn

Ứng dụng. Một xe goòng chuyển động từ A đến B dưới tác dụng của lực $\vec{F}$. Lực $\vec{F}$ tạo với hướng chuyển động một góc α, tức là $(\vec{F}, \overrightarrow{AB}) = \alpha$ (h.2.10).



Hình 2.10

Lực $\vec{F}$ được phân tích thành hai thành phần $\vec{F_1}$ và $\vec{F_2}$ trong đó $\vec{F_1}$ vuông góc với $\overrightarrow{AB}$, còn $\vec{F_2}$ là hình chiếu của $\vec{F}$ lên đường thẳng AB. Ta có $\vec{F} = \vec{F_1} + \vec{F_2}$. Công $\mathcal{A}$ của lực $\vec{F}$ là $\mathcal{A} = \vec{F}.\overrightarrow{AB} = (\vec{F_1} + \vec{F_2}).\overrightarrow{AB} =$
$= \vec{F_1}.\overrightarrow{AB} + \vec{F_2}.\overrightarrow{AB} = \vec{F_2}.\overrightarrow{AB}.$

Như vậy lực thành phần $\vec{F_1}$ không làm cho xe goòng chuyển động nên không sinh công. Chỉ có thành phần $\vec{F_2}$ của lực $\vec{F}$ sinh công làm cho xe goòng chuyển động từ A đến B.

Công thức $\mathcal{A} = \vec{F} . \overrightarrow{AB}$ là công thức tính công của lực $\vec{F}$ làm vật di chuyển từ A đến B mà ta đã biết trong vật lí.

3. Biểu thức toạ độ của tích vô hướng

Trên mặt phẳng toạ độ $(O ; \vec{i}, \vec{j})$, cho hai vectơ $\vec{a} = (a_1 ; a_2)$, $\vec{b} = (b_1 ; b_2)$. Khi đó tích vô hướng $\vec{a} . \vec{b}$ là :

$$\boxed{\vec{a} . \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2.}$$

Thật vậy $\vec{a} . \vec{b} = (a_1 \vec{i} + a_2 \vec{j}) . (b_1 \vec{i} + b_2 \vec{j})$

$$= a_1 b_1 \vec{i}^{\,2} + a_2 b_2 \vec{j}^{\,2} + a_1 b_2 . \vec{i} . \vec{j} + a_2 b_1 . \vec{j} . \vec{i} .$$

Vì $\vec{i}^{\,2} = \vec{j}^{\,2} = 1$ và $\vec{i} . \vec{j} = \vec{j} . \vec{i} = 0$ nên suy ra :

$$\vec{a} . \vec{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2.$$

http://sachviet.edu.vn

Nhận xét. Hai vectơ $\vec{a} = (a_1 ; a_2)$, $\vec{b} = (b_1 ; b_2)$ đều khác vectơ $\vec{0}$ vuông góc với nhau khi và chỉ khi

$$a_1 b_1 + a_2 b_2 = 0.$$

2 Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho ba điểm $A(2 ; 4)$, $B(1 ; 2)$, $C(6 ; 2)$. Chứng minh rằng $\overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{AC}$.

4. Ứng dụng

a) Độ dài của vectơ

Độ dài của vectơ $\vec{a} = (a_1 ; a_2)$ được tính theo công thức :

$$|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}.$$

Thật vậy, ta có $|\vec{a}|^2 = \vec{a}^2 = \vec{a}.\vec{a} = a_1 a_1 + a_2 a_2 = a_1^2 + a_2^2$.

Do đó $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2}$.

b) Góc giữa hai vectơ

Từ định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ ta suy ra nếu $\vec{a} = (a_1 ; a_2)$ và $\vec{b} = (b_1 ; b_2)$ đều khác $\vec{0}$ thì ta có :

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a}.\vec{b}}{|\vec{a}|.|\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2}.\sqrt{b_1^2 + b_2^2}}.$$

Ví dụ. Cho $\overrightarrow{OM} = (-2 ; -1)$, $\overrightarrow{ON} = (3 ; -1)$.

Ta có $\cos \widehat{MON} = \cos(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}) = \dfrac{\overrightarrow{OM}.\overrightarrow{ON}}{|\overrightarrow{OM}|.|\overrightarrow{ON}|} = \dfrac{-6+1}{\sqrt{5}.\sqrt{10}} = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Vậy $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{ON}) = 135^\circ$

http://sachviet.edu.vn

c) Khoảng cách giữa hai điểm

Khoảng cách giữa hai điểm $A(x_A ; y_A)$ và $B(x_B ; y_B)$ được tính theo công thức :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Thật vậy, vì $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A \ ; \ y_B - y_A)$ nên ta có

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Ví dụ. Cho hai điểm $M(-2 ; 2)$ và $N(1 ; 1)$. Khi đó $\overrightarrow{MN} = (3 ; -1)$ và khoảng cách MN là : $|\overrightarrow{MN}| = \sqrt{3^2 + (-1)^2} = \sqrt{10}$.

Câu hỏi và bài tập

1. Cho tam giác vuông cân ABC có $AB = AC = a$. Tính các tích vô hướng $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}$, $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{CB}$.

2. Cho ba điểm O, A, B thẳng hàng và biết $OA = a$, $OB = b$. Tính tích vô hướng $\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}$ trong hai trường hợp :

a) Điểm O nằm ngoài đoạn AB ;

b) Điểm O nằm trong đoạn AB .

3. Cho nửa đường tròn tâm O có đường kính $AB = 2R$. Gọi M và N là hai điểm thuộc nửa đường tròn sao cho hai dây cung AM và BN cắt nhau tại I.

a) Chứng minh $\overrightarrow{AI}.\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{AI}.\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{BI}.\overrightarrow{BN} = \overrightarrow{BI}.\overrightarrow{BA}$;

b) Hãy dùng kết quả câu a) để tính $\overrightarrow{AI}.\overrightarrow{AM} + \overrightarrow{BI}.\overrightarrow{BN}$ theo R.

4. Trên mặt phẳng Oxy, cho hai điểm $A(1 ; 3)$, $B(4 ; 2)$.

a) Tìm toạ độ điểm D nằm trên trục Ox sao cho $DA = DB$;

b) Tính chu vi tam giác OAB ;

c) Chứng tỏ OA vuông góc với AB và từ đó tính diện tích tam giác OAB.

http://sachviet.edu.vn

5. Trên mặt phẳng Oxy hãy tính góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ trong các trường hợp sau :

a) $\vec{a} = (2 ; -3)$, $\vec{b} = (6 ; 4)$;

b) $\vec{a} = (3 ; 2)$, $\vec{b} = (5 ; -1)$;

c) $\vec{a} = (-2 ; -2\sqrt{3})$, $\vec{b} = (3 ; \sqrt{3})$.

6. Trên mặt phẳng toạ độ Oxy cho bốn điểm $A(7 ; -3)$, $B(8 ; 4)$, $C(1 ; 5)$, $D(0 ; -2)$. Chứng minh rằng tứ giác $ABCD$ là hình vuông.

7. Trên mặt phẳng Oxy cho điểm $A(-2 ; 1)$. Gọi B là điểm đối xứng với điểm A qua gốc toạ độ O. Tìm toạ độ của điểm C có tung độ bằng 2 sao cho tam giác ABC vuông ở C.

http://sachviet.edu.vn

§3. CÁC HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VÀ GIẢI TAM GIÁC

Chúng ta biết rằng một tam giác được hoàn toàn xác định nếu biết một số yếu tố, chẳng hạn biết ba cạnh, hoặc hai cạnh và góc xen giữa hai cạnh đó.

Như vậy giữa các cạnh và các góc của một tam giác có một mối liên hệ xác định nào đó mà ta sẽ gọi là *các hệ thức lượng trong tam giác*. Trong phần này chúng ta sẽ nghiên cứu những hệ thức đó và các ứng dụng của chúng.

Đối với tam giác ABC ta thường kí hiệu : $a = BC$, $b = CA$, $c = AB$.

1 Tam giác ABC vuông tại A có đường cao $AH = h$ và có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Gọi $BH = c'$ và $CH = b'$ (h.2.11). Hãy điền vào các ô trống trong các hệ thức sau đây để được các hệ thức lượng trong tam giác vuông :

http://sachviet.edu.vn

$a^2 = b^2 + \boxed{\ldots}$

$b^2 = a \times \boxed{\ldots}$

$c^2 = a \times \boxed{\ldots}$

$h^2 = b' \times \boxed{\ldots}$

$ah = b \times \boxed{\ldots}$

$\dfrac{1}{\boxed{\ldots}} = \dfrac{1}{b^2} + \dfrac{1}{c^2}$



Hình 2.11

$\sin B = \cos C = \dfrac{\boxed{\ldots}}{a}$; $\sin C = \cos B = \dfrac{\boxed{\ldots}}{a}$

$\tan B = \cot C = \dfrac{\boxed{\ldots}}{c}$; $\cot B = \tan C = \dfrac{\boxed{\ldots}}{b}$.

Trước tiên ta tìm hiểu hai hệ thức lượng cơ bản trong tam giác bất kì là định lí côsin và định lí sin.

1. Định lí côsin

a) Bài toán. Trong tam giác ABC cho biết hai cạnh AB, AC và góc A, hãy tính cạnh BC (hình 2.12).



Hình 2.12

GIẢI

Ta có $BC^2 = |\overrightarrow{BC}|^2 = \left(\overrightarrow{AC} - \overrightarrow{AB}\right)^2$

$= \overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{AB}^2 - 2\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{AB}$

$BC^2 = \overrightarrow{AC}^2 + \overrightarrow{AB}^2 - 2|\overrightarrow{AC}|.|\overrightarrow{AB}|\cos A$.

Vậy ta có $BC^2 = AC^2 + AB^2 - 2AC.AB.\cos A$

nên $BC = \sqrt{AC^2 + AB^2 - 2AC.AB.\cos A}$.

http://sachviet.edu.vn

Từ kết quả của bài toán trên ta suy ra định lí sau đây :

b) Định lí côsin

Trong tam giác ABC bất kì với BC = a, CA = b, AB = c ta có :

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A;$$
$$b^2 = a^2 + c^2 - 2ac\cos B;$$
$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C.$$

2 Hãy phát biểu định lí côsin bằng lời.

3 Khi *ABC* là tam giác vuông, định lí côsin trở thành định lí quen thuộc nào ?

Từ định lí côsin ta suy ra :

Hệ quả

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc};$$
$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac};$$
$$\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}.$$

c) Áp dụng. Tính độ dài đường trung tuyến của tam giác.

Cho tam giác *ABC* có các cạnh *BC* = *a*, *CA* = *b* và *AB* = *c*. Gọi m_a, m_b và m_c là độ dài các đường trung tuyến lần lượt vẽ từ các đỉnh *A*, *B* và *C* của tam giác. Ta có :

$$m_a^2 = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4};$$
$$m_b^2 = \frac{2(a^2 + c^2) - b^2}{4};$$
$$m_c^2 = \frac{2(a^2 + b^2) - c^2}{4}.$$



Hình 2.13

http://sachviet.edu.vn

Thật vậy, gọi M là trung điểm của cạnh BC, áp dụng định lí côsin vào tam giác AMB ta có :

$$m_a^2 = c^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 - 2c.\frac{a}{2}.\cos B = c^2 + \frac{a^2}{4} - ac\cos B$$

Vì $\cos B = \dfrac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac}$ nên ta suy ra :

$$m_a^2 = c^2 + \frac{a^2}{4} - ac \cdot \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{2(b^2 + c^2) - a^2}{4}.$$

Chứng minh tương tự ta có :

$$m_b^2 = \frac{2(a^2 + c^2) - b^2}{4}$$

$$m_c^2 = \frac{2(a^2 + b^2) - c^2}{4}.$$

4 Cho tam giác ABC có $a = 7$ cm, $b = 8$ cm và $c = 6$ cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến m_a của tam giác ABC đã cho.

d) Ví dụ

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC có các cạnh $AC = 10$ cm, $BC = 16$ cm và góc $\widehat{C} = 110^\circ$. Tính cạnh AB và các góc A, B của tam giác đó.

GIẢI

Đặt $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$.

Theo định lí côsin ta có :

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$
$$= 16^2 + 10^2 - 2.16.10.\cos 110^\circ$$
$$c^2 \approx 465{,}44.$$

Vậy $c \approx \sqrt{465{,}44} \approx 21{,}6$ (cm).



Hình 2.14

http://sachviet.edu.vn

Theo hệ quả định lí côsin ta có :

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \approx \frac{10^2 + (21,6)^2 - 16^2}{2.10.(21,6)} \approx 0,7188.$$

Suy ra $\widehat{A} \approx 44^o2'$, $\widehat{B} = 180^o - (\widehat{A} + \widehat{C}) \approx 25^o58'$.

Ví dụ 2. Hai lực $\vec{f_1}$ và $\vec{f_2}$ cho trước cùng tác dụng lên một vật và tạo thành góc nhọn $(\vec{f_1}, \vec{f_2}) = \alpha$. Hãy lập công thức tính cường độ của hợp lực $\vec{s}$.

GIẢI

Đặt $\overrightarrow{AB} = \vec{f_1}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{f_2}$ và vẽ hình bình hành $ABCD$ (h.2.15).



Hình 2.15

Khi đó $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \vec{f_1} + \vec{f_2} = \vec{s}$.

Vậy $|\vec{s}| = |\overrightarrow{AC}| = |\vec{f_1} + \vec{f_2}|$.

Theo định lí côsin đối với tam giác ABC ta có

$$AC^2 = AB^2 + BC^2 - 2AB.BC.\cos B,$$

hay $$|\vec{s}|^2 = |\vec{f_1}|^2 + |\vec{f_2}|^2 - 2|\vec{f_1}|.|\vec{f_2}|.\cos(180^o - \alpha).$$

Do đó $$|\vec{s}| = \sqrt{\vec{f_1}^2 + \vec{f_2}^2 + 2|\vec{f_1}|.|\vec{f_2}|.\cos\alpha}.$$

2. Định lí sin

5 Cho tam giác ABC vuông ở A nội tiếp trong đường tròn bán kính R và có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$. Chứng minh hệ thức :

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

Đối với tam giác ABC bất kì ta cũng có hệ thức trên. Hệ thức này được gọi là *định lí sin* trong tam giác.

http://sachviet.edu.vn

a) Định lí sin

Trong tam giác ABC bất kì với BC = a, CA = b, AB = c và R là bán kính đường tròn ngoại tiếp, ta có :

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$$

CHỨNG MINH. Ta chứng minh hệ thức $\frac{a}{\sin A} = 2R$. Xét hai trường hợp :

• Nếu góc A nhọn, ta vẽ đường kính BD của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC và khi đó vì tam giác BCD vuông tại C nên ta có $BC = BD.\sin D$ hay $a = 2R.\sin D$ (h.2.16a).

Ta có $\overset{\frown}{BAC} = \overset{\frown}{BDC}$ vì đó là hai góc nội tiếp cùng chắn cung $\overset{\frown}{BC}$. Do đó $a = 2R.\sin A$ hay $\frac{a}{\sin A} = 2R.$



Hình 2.16

• Nếu góc A tù, ta cũng vẽ đường kính BD của đường tròn tâm O ngoại tiếp tam giác ABC (h.2.16b). Tứ giác $ABDC$ nội tiếp đường tròn tâm O nên $\widehat{D} = 180^\circ - \widehat{A}$. Do đó $\sin D = \sin(180^\circ - A)$. Ta cũng có $BC = BD.\sin D$ hay $a = BD.\sin A$.

Vậy $a = 2R.\sin A$ hay $\frac{a}{\sin A} = 2R.$

http://sachviet.edu.vn

Các đẳng thức $\frac{b}{\sin B} = 2R$ và $\frac{c}{\sin C} = 2R$ được chứng minh tương tự.

Vậy ta có $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R.$

6 Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Hãy tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

b) Ví dụ. Cho tam giác ABC có $\widehat{B} = 20^\circ$, $\widehat{C} = 31^\circ$ và cạnh $b = 210$ cm. Tính $\widehat{A}$, các cạnh còn lại và bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

GIẢI



Hình 2.17

Ta có $\widehat{A} = 180^\circ - (20^\circ + 31^\circ)$, do đó $\widehat{A} = 129^\circ$ (h.2.17).

Mặt khác theo định lí sin ta có : $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$ (1)

Từ (1) suy ra $a = \frac{b \sin A}{\sin B} = \frac{210.\sin 129^\circ}{\sin 20^\circ} \approx 477{,}2$ (cm).

$$c = \frac{b \sin C}{\sin B} = \frac{210.\sin 31^\circ}{\sin 20^\circ} \approx 316{,}2 \text{ (cm)}.$$

$$R = \frac{a}{2 \sin A} = \frac{477{,}2}{2.\sin 129^\circ} \approx 307{,}02 \text{ (cm)}.$$

http://sachviet.edu.vn

3. Công thức tính diện tích tam giác

Ta kí hiệu h_a, h_b và h_c là các đường cao của tam giác ABC lần lượt vẽ từ các đỉnh A, B, C và S là diện tích tam giác đó.

▲7 Hãy viết các công thức tính diện tích tam giác theo một cạnh và đường cao tương ứng.

Cho tam giác ABC có các cạnh $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$.

Gọi R và r lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác và $p = \dfrac{a+b+c}{2}$ là nửa chu vi của tam giác.

Diện tích S của tam giác ABC được tính theo một trong các công thức sau

$$S = \frac{1}{2}ab\sin C = \frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ca\sin B \ ; \quad (1)$$

$$S = \frac{abc}{4R} \ ; \quad (2)$$

$$S = pr \ ; \quad (3)$$

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} \quad \text{(công thức Hê-rông).} \quad (4)$$

Ta chứng minh công thức (1).

Ta đã biết $S = \dfrac{1}{2}ah_a$ với $h_a = AH = AC\sin C = b\sin C$ (kể cả $\widehat{C}$ nhọn, tù hay vuông) (h.2.18).



Hình 2.18

http://sachviet.edu.vn

Do đó $S = \frac{1}{2}ab\sin C$.

Các công thức $S = \frac{1}{2}bc\sin A$ và $S = \frac{1}{2}ca\sin B$ được chứng minh tương tự.

8 Dựa vào công thức (1) và định lí sin, hãy chứng minh $S = \frac{abc}{4R}$.

9 Chứng minh công thức $S = pr$ (h.2.19).



Hình 2.19

Ta thừa nhận công thức Hê-rông.

Ví dụ 1. Tam giác ABC có các cạnh $a = 13$ m, $b = 14$ m và $c = 15$ m.

a) Tính diện tích tam giác ABC ;

b) Tính bán kính đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp tam giác ABC.

GIẢI

a) Ta có $p = \frac{1}{2}(13 + 14 + 15) = 21$. Theo công thức Hê-rông ta có :

$$S = \sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)} = 84\ (\text{m}^2).$$

b) Áp dụng công thức $S = pr$ ta có $r = \frac{S}{p} = \frac{84}{21} = 4$.

Vậy đường tròn nội tiếp tam giác ABC có bán kính là $r = 4$ m.

Từ công thức $S = \frac{abc}{4R}$.

Ta có $$R = \frac{abc}{4S} = \frac{13.14.15}{336} = 8{,}125\ (\text{m}).$$

http://sachviet.edu.vn

Ví dụ 2. Tam giác ABC có cạnh $a = 2\sqrt{3}$, cạnh $b = 2$ và $\widehat{C} = 30^\circ$. Tính cạnh c, góc A và diện tích tam giác đó.

GIẢI

Theo định lí côsin ta có

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C = 12 + 4 - 2.2\sqrt{3}.2.\frac{\sqrt{3}}{2} = 4.$$

Vậy $c = 2$ và tam giác ABC có $AB = AC = 2$. Ta suy ra $\widehat{B} = \widehat{C} = 30^\circ$.

Do đó $\widehat{A} = 120^\circ$.

Ta có $S = \frac{1}{2}ac\sin B = \frac{1}{2}\cdot 2\sqrt{3}\cdot 2\cdot\frac{1}{2} = \sqrt{3}$ (đơn vị diện tích).

4. Giải tam giác và ứng dụng vào việc đo đạc

a) Giải tam giác

Giải tam giác là tìm một số yếu tố của tam giác khi cho biết các yếu tố khác.

Hình 2.20. Giác kế dùng để ngắm và đo đạc.

Muốn giải tam giác ta thường sử dụng các hệ thức đã được nêu lên trong định lí côsin, định lí sin và các công thức tính diện tích tam giác.

http://sachviet.edu.vn

Ví dụ 1. Cho tam giác ABC biết cạnh $a = 17{,}4$ m, $\widehat{B} = 44^\circ 30'$ và $\widehat{C} = 64^\circ$. Tính góc $\widehat{A}$ và các cạnh b, c.

GIẢI

Ta có $\widehat{A} = 180^\circ - (\widehat{B} + \widehat{C}) = 180^\circ - (44^\circ 30' + 64^\circ) = 71^\circ 30'$.

Theo định lí sin ta có $\dfrac{a}{\sin A} = \dfrac{b}{\sin B} = \dfrac{c}{\sin C}$,

do đó $b = \dfrac{a \sin B}{\sin A} \approx \dfrac{17{,}4.0{,}7009}{0{,}9483} \approx 12{,}9$ (m),

$c = \dfrac{a \sin C}{\sin A} \approx \dfrac{17{,}4.0{,}8988}{0{,}9483} \approx 16{,}5$ (m).

Ví dụ 2. Cho tam giác ABC có cạnh $a = 49{,}4$ cm, $b = 26{,}4$ cm và $\widehat{C} = 47^\circ 20'$. Tính cạnh c, $\widehat{A}$ và $\widehat{B}$.

GIẢI

Theo định lí côsin ta có

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

$$\approx (49{,}4)^2 + (26{,}4)^2 - 2.49{,}4.26{,}4.0{,}6777 \approx 1369{,}66.$$

Vậy $c \approx \sqrt{1369{,}66} \approx 37$ (cm).

Ta có $\cos A = \dfrac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} \approx \dfrac{697 + 1370 - 2440}{2.26{,}4.37} \approx -0{,}191$.

Như vậy $\widehat{A}$ là góc tù và ta có $\widehat{A} \approx 101^\circ$.

Do đó $\widehat{B} = 180^\circ - (\widehat{A} + \widehat{C}) \approx 180^\circ - (101^\circ + 47^\circ 20') \approx 31^\circ 40'$.

Ví dụ 3. Cho tam giác ABC có cạnh $a = 24$ cm, $b = 13$ cm và $c = 15$ cm. Tính diện tích S của tam giác và bán kính r của đường tròn nội tiếp.

http://sachviet.edu.vn

GIẢI

Theo định lí côsin ta có

$$\cos A = \frac{b^2 + c^2 - a^2}{2bc} = \frac{169 + 225 - 576}{2.13.15} \approx -0{,}4667,$$

như vậy $\widehat{A}$ là góc tù và ta tính được $\widehat{A} \approx 117^o49' \Rightarrow \sin A \approx 0{,}88$.

Ta có $S = \frac{1}{2} bc\sin A = \frac{1}{2}.13.15.0{,}88 \approx 85{,}8\ (\text{cm}^2)$.

Áp dụng công thức $S = pr$ ta có $r = \frac{S}{p}$. Vì $p = \frac{24+13+15}{2} = 26$ nên

$r \approx \frac{85{,}8}{26} = 3{,}3$ (cm).

b) Ứng dụng vào việc đo đạc

Bài toán 1. Đo chiều cao của một cái tháp mà không thể đến được chân tháp.

Giả sử $CD = h$ là chiều cao của tháp trong đó C là chân tháp. Chọn hai điểm A, B trên mặt đất sao cho ba điểm A, B và C thẳng hàng. Ta đo khoảng cách AB và các góc $\widehat{CAD}$, $\widehat{CBD}$. Chẳng hạn ta đo được $AB = 24$ m, $\widehat{CAD} = \alpha = 63^o$, $\widehat{CBD} = \beta = 48^o$. Khi đó chiều cao h của tháp được tính như sau :



Hình 2.21

http://sachviet.edu.vn

Áp dụng định lí sin vào tam giác ABD ta có

$$\frac{AD}{\sin\beta} = \frac{AB}{\sin D}.$$

Ta có $\alpha = \widehat{D} + \beta$ nên $\widehat{D} = \alpha - \beta = 63^\circ - 48^\circ = 15^\circ$.

Do đó $AD = \dfrac{AB\sin\beta}{\sin(\alpha-\beta)} = \dfrac{24\sin 48^\circ}{\sin 15^\circ} \approx 68{,}91$.

Trong tam giác vuông ACD ta có $h = CD = AD\sin\alpha \approx 61{,}4$ (m).

Bài toán 2. Tính khoảng cách từ một địa điểm trên bờ sông đến một gốc cây trên một cù lao ở giữa sông.

Để đo khoảng cách từ một điểm A trên bờ sông đến gốc cây C trên cù lao giữa sông, người ta chọn một điểm B cùng ở trên bờ với A sao cho từ A và B có thể nhìn thấy điểm C. Ta đo khoảng cách AB, góc $\widehat{CAB}$ và $\widehat{CBA}$. Chẳng hạn ta đo được $AB = 40$ m, $\widehat{CAB} = \alpha = 45^\circ$, $\widehat{CBA} = \beta = 70^\circ$.



Hình 2.22

Khi đó khoảng cách AC được tính như sau :

Áp dụng định lí sin vào tam giác ABC, ta có

$$\frac{AC}{\sin B} = \frac{AB}{\sin C} \quad \text{(h.2.22)}.$$

http://sachviet.edu.vn

Vì $\sin C = \sin(\alpha+\beta)$ nên $AC = \dfrac{AB\sin\beta}{\sin(\alpha+\beta)} = \dfrac{40.\sin 70^\circ}{\sin 115^\circ} \approx 41{,}47$ (m).

Vậy $AC \approx 41{,}47$ (m).

Câu hỏi và bài tập

1. Cho tam giác ABC vuông tại A, $\widehat{B} = 58^\circ$ và cạnh $a = 72$ cm. Tính $\widehat{C}$, cạnh b, cạnh c và đường cao h_a.

2. Cho tam giác ABC biết các cạnh $a = 52{,}1$ cm, $b = 85$ cm và $c = 54$ cm. Tính các góc $\widehat{A}$, $\widehat{B}$ và $\widehat{C}$.

3. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 120^\circ$, cạnh $b = 8$ cm và $c = 5$ cm. Tính cạnh a, và các góc $\widehat{B}$, $\widehat{C}$ của tam giác đó.

4. Tính diện tích S của tam giác có số đo các cạnh lần lượt là 7, 9 và 12.

5. Tam giác ABC có $\widehat{A} = 120^\circ$. Tính cạnh BC cho biết cạnh $AC = m$ và $AB = n$.

6. Tam giác ABC có các cạnh $a = 8$ cm, $b = 10$ cm và $c = 13$ cm.
a) Tam giác đó có góc tù không ?
b) Tính độ dài trung tuyến MA của tam giác ABC đó.

7. Tính góc lớn nhất của tam giác ABC biết
a) Các cạnh $a = 3$ cm, $b = 4$ cm và $c = 6$ cm;
b) Các cạnh $a = 40$ cm, $b = 13$ cm và $c = 37$ cm.

8. Cho tam giác ABC biết cạnh $a = 137{,}5$ cm, $\widehat{B} = 83^\circ$ và $\widehat{C} = 57^\circ$. Tính góc A, bán kính R của đường tròn ngoại tiếp, cạnh b và c của tam giác.

9. Cho hình bình hành $ABCD$ có $AB = a$, $BC = b$, $BD = m$ và $AC = n$. Chứng minh rằng $m^2 + n^2 = 2(a^2 + b^2)$.

http://sachviet.edu.vn

10. Hai chiếc tàu thuỷ P và Q cách nhau 300 m. Từ P và Q thẳng hàng với chân A của tháp hải đăng AB ở trên bờ biển người ta nhìn chiều cao AB của tháp dưới các góc $\widehat{BPA} = 35^\circ$ và $\widehat{BQA} = 48^\circ$. Tính chiều cao của tháp.

11. Muốn đo chiều cao của Tháp Chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận (h.2.23), người ta lấy hai điểm A và B trên mặt đất có khoảng cách AB = 12 m cùng thẳng hàng với chân C của tháp để đặt hai giác kế (h.2.24). Chân của giác kế có chiều cao h = 1,3 m. Gọi D là đỉnh tháp và hai điểm A_1, B_1 cùng thẳng hàng với C_1 thuộc chiều cao CD của tháp. Người ta đo được $\widehat{DA_1C_1} = 49^\circ$ và $\widehat{DB_1C_1} = 35^\circ$. Tính chiều cao CD của tháp đó.

Hình 2.23



Hình 2.24

http://sachviet.edu.vn

Bạn có biết

Người ta đã đo khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng như thế nào ?

Loài người đã biết được khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng cách đây khoảng hai ngàn năm với một độ chính xác tuyệt vời là vào khoảng 384 000 km. Sau đó khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng đã được xác lập một cách chắc chắn vào năm 1751 do một nhà thiên văn người Pháp là Giô-dep La-lăng (*Joseph Lalande*, 1732-1807) và một nhà toán học người Pháp là Ni-cô-la La-cay (*Nicolas Lacaille*, 1713-1762). Hai ông đã phối hợp tổ chức đứng ở hai địa điểm rất xa nhau, một người ở Bec-lin gọi là điểm *A*, còn người kia ở Mũi Hảo Vọng (*Bonne-Espérance*) một mũi đất ở cực nam châu Phi, gọi là điểm *B* (h. 2.25). Gọi *C* là một điểm trên Mặt Trăng. Từ *A* và *B* người ta đo và tính được các góc *A*, *B* và cạnh *AB* của tam giác *ABC*.



Hình 2.25

Trong mặt phẳng (*ABC*), gọi tia *Ax* là đường chân trời vẽ từ đỉnh *A* và tia *By* là đường chân trời vẽ từ đỉnh *B*. Kí hiệu $\alpha = \widehat{CAx}$, $\beta = \widehat{CBy}$.

Gọi *O* là tâm Trái Đất, ta có :

$$u = \widehat{xAB} = \widehat{yBA} = \frac{1}{2}\widehat{AOB}.$$

Tam giác *ABC* có $\widehat{A} = \alpha + u$, $\widehat{B} = \beta + u$.

Vì biết độ dài cung $\widehat{AB}$ nên ta tính được góc *AOB* và do đó tính được độ dài cạnh *AB*. Tam giác *ABC* được xác định vì biết "góc - cạnh - góc" của tam giác đó. Từ đó ta có thể tính được chiều cao *CH* của tam giác *ABC* là khoảng cách cần tìm. Người ta nhận thấy rằng khoảng cách này gần bằng mười lần độ dài xích đạo của Trái Đất ($\approx 10 \times 40\,000$ km).

http://sachviet.edu.vn

ÔN TẬP CHƯƠNG II

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Hãy nhắc lại định nghĩa giá trị lượng giác của một góc α với $0^\circ \le \alpha \le 180^\circ$. Tại sao khi α là các góc nhọn thì giá trị lượng giác này lại chính là các tỉ số lượng giác đã được học ở lớp 9 ?

2. Tại sao hai góc bù nhau lại có sin bằng nhau và côsin đối nhau ?

3. Nhắc lại định nghĩa tích vô hướng của hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Tích vô hướng này với $|\vec{a}|$ và $|\vec{b}|$ không đổi đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất khi nào ?

4. Trong mặt phẳng Oxy cho vectơ $\vec{a} = (-3 ; 1)$ và vectơ $\vec{b} = (2 ; 2)$, hãy tính tích vô hướng $\vec{a}.\vec{b}$.

5. Hãy nhắc lại định lí côsin trong tam giác. Từ các hệ thức này hãy tính $\cos A$, $\cos B$ và $\cos C$ theo các cạnh của tam giác.

6. Từ hệ thức $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos A$ trong tam giác, hãy suy ra định lí Py-ta-go.

7. Chứng minh rằng với mọi tam giác ABC, ta có $a = 2R\sin A$, $b = 2R\sin B$, $c = 2R\sin C$, trong đó R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác.

8. Cho tam giác ABC. Chứng minh rằng :

a) Góc A nhọn khi và chỉ khi $a^2 < b^2 + c^2$;

b) Góc A tù khi và chỉ khi $a^2 > b^2 + c^2$;

c) Góc A vuông khi và chỉ khi $a^2 = b^2 + c^2$.

9. Cho tam giác ABC có $\widehat{A} = 60^\circ$, $BC = 6$. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đó.

10. Cho tam giác ABC có $a = 12$, $b = 16$, $c = 20$. Tính diện tích S của tam giác, chiều cao h_a, các bán kính R, r của các đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp tam giác và đường trung tuyến m_a của tam giác.

11. Trong tập hợp các tam giác có hai cạnh là a và b, tìm tam giác có diện tích lớn nhất.

http://sachviet.edu.vn

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Trong các đẳng thức sau đây đẳng thức nào là đúng ?

(A) $\sin 150^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$;

(B) $\cos 150^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

(C) $\tan 150^\circ = -\frac{1}{\sqrt{3}}$;

(D) $\cot 150^\circ = \sqrt{3}$.

2. Cho α và β là hai góc khác nhau và bù nhau. Trong các đẳng thức sau đây, đẳng thức nào sai ?

(A) $\sin\alpha = \sin\beta$;

(B) $\cos\alpha = -\cos\beta$;

(C) $\tan\alpha = -\tan\beta$;

(D) $\cot\alpha = \cot\beta$.

3. Cho α là góc tù. Điều khẳng định nào sau đây là đúng ?

(A) $\sin\alpha < 0$;

(B) $\cos\alpha > 0$;

(C) $\tan\alpha < 0$;

(D) $\cot\alpha > 0$.

4. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai ?

(A) $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ$;

(B) $\cos 45^\circ = \sin 135^\circ$;

(C) $\cos 30^\circ = \sin 120^\circ$;

(D) $\sin 60^\circ = \cos 120^\circ$.

5. Cho hai góc nhọn α và β trong đó $\alpha < \beta$. Khẳng định nào sau đây là sai ?

(A) $\cos\alpha < \cos\beta$;

(B) $\sin\alpha < \sin\beta$;

(C) $\alpha + \beta = 90^\circ \Rightarrow \cos\alpha = \sin\beta$;

(D) $\tan\alpha + \tan\beta > 0$.

6. Tam giác ABC vuông ở A và có góc $\widehat{B} = 30^\circ$. Khẳng định nào sau đây là sai ?

(A) $\cos B = \frac{1}{\sqrt{3}}$;

(B) $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

(C) $\cos C = \frac{1}{2}$;

(D) $\sin B = \frac{1}{2}$.

7. Tam giác đều ABC có đường cao AH. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

(A) $\sin \widehat{BAH} = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

(B) $\cos \widehat{BAH} = \frac{1}{\sqrt{3}}$;

(C) $\sin \widehat{ABC} = \frac{\sqrt{3}}{2}$;

(D) $\sin \widehat{AHC} = \frac{1}{2}$.

http://sachviet.edu.vn

8. Điều khẳng định nào sau đây là đúng ?

(A) $\sin\alpha = \sin(180^\circ - \alpha)$; (B) $\cos\alpha = \cos(180^\circ - \alpha)$;

(C) $\tan\alpha = \tan(180^\circ - \alpha)$; (D) $\cot\alpha = \cot(180^\circ - \alpha)$.

9. Tìm khẳng định sai trong các khẳng định sau đây :

(A) $\cos 35^\circ > \cos 10^\circ$; (B) $\sin 60^\circ < \sin 80^\circ$;

(C) $\tan 45^\circ < \tan 60^\circ$; (D) $\cos 45^\circ = \sin 45^\circ$.

10. Tam giác ABC vuông ở A và có góc $\widehat{B} = 50^\circ$. Hệ thức nào sau đây là sai ?

(A) $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}\right) = 130^\circ$; (B) $\left(\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{AC}\right) = 40^\circ$;

(C) $\left(\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CB}\right) = 50^\circ$; (D) $\left(\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{CB}\right) = 120^\circ$.

11. Cho $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là hai vectơ cùng hướng và đều khác vectơ $\vec{0}$. Trong các kết quả sau đây, hãy chọn kết quả đúng.

(A) $\vec{a}.\vec{b} = |\vec{a}|.|\vec{b}|$; (B) $\vec{a}.\vec{b} = 0$;

(C) $\vec{a}.\vec{b} = -1$; (D) $\vec{a}.\vec{b} = -|\vec{a}|.|\vec{b}|$.

12. Cho tam giác ABC vuông cân tại A có $AB = AC = 30$ cm. Hai đường trung tuyến BF và CE cắt nhau tại G. Diện tích tam giác GFC là :

(A) 50 cm^2 ; (B) $50\sqrt{2}$ cm^2 ;

(C) 75 cm^2 ; (D) $15\sqrt{105}$ cm^2.

13. Cho tam giác ABC vuông tại A có $AB = 5$ cm, $BC = 13$ cm. Gọi góc $\widehat{ABC} = \alpha$ và $\widehat{ACB} = \beta$. Hãy chọn kết luận đúng khi so sánh α và β :

(A) $\beta > \alpha$; (B) $\beta < \alpha$;

(C) $\beta = \alpha$; (D) $\alpha \le \beta$.

14. Cho góc $\widehat{xOy} = 30^\circ$. Gọi A và B là hai điểm di động lần lượt trên Ox và Oy sao cho $AB = 1$. Độ dài lớn nhất của đoạn OB bằng :

(A) 1,5 ; (B) $\sqrt{3}$; (C) $2\sqrt{2}$; (D) 2.

http://sachviet.edu.vn

15. Cho tam giác ABC có $BC = a, CA = b, AB = c$. Mệnh đề nào sau đây là đúng ?

(A) Nếu $b^2 + c^2 - a^2 > 0$ thì góc A nhọn ;

(B) Nếu $b^2 + c^2 - a^2 > 0$ thì góc A tù ;

(C) Nếu $b^2 + c^2 - a^2 < 0$ thì góc A nhọn ;

(D) Nếu $b^2 + c^2 - a^2 < 0$ thì góc A vuông.

16. Đường tròn tâm O có bán kính $R = 15$ cm. Gọi P là một điểm cách tâm O một khoảng $PO = 9$ cm. Dây cung đi qua P và vuông góc với PO có độ dài là :

(A) 22 cm ; (B) 23 cm ; (C) 24 cm ; (D) 25 cm.

17. Cho tam giác ABC có $AB = 8$ cm, $AC = 18$ cm và có diện tích bằng $64\ \text{cm}^2$. Giá trị $\sin A$ là :

(A) $\frac{\sqrt{3}}{2}$; (B) $\frac{3}{8}$; (C) $\frac{4}{5}$; (D) $\frac{8}{9}$.

18. Cho hai góc nhọn α và β phụ nhau. Hệ thức nào sau đây là sai ?

(A) $\sin\alpha = -\cos\beta$; (B) $\cos\alpha = \sin\beta$;

(C) $\tan\alpha = \cot\beta$; (D) $\cot\alpha = \tan\beta$.

19. Bất đẳng thức nào dưới đây là đúng ?

(A) $\sin 90^\circ < \sin 150^\circ$; (B) $\sin 90^\circ 15' < \sin 90^\circ 30'$;

(C) $\cos 90^\circ 30' > \cos 100^\circ$; (D) $\cos 150^\circ > \cos 120^\circ$.

20. Cho tam giác ABC vuông tại A. Khẳng định nào sau đây là sai ?

(A) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC} < \overrightarrow{BA}.\overrightarrow{BC}$; (B) $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{CB} < \overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BC}$;

(C) $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{BC} < \overrightarrow{CA}.\overrightarrow{CB}$; (D) $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{BC} < \overrightarrow{BC}.\overrightarrow{AB}$.

21. Cho tam giác ABC có $AB = 4$ cm, $BC = 7$ cm, $CA = 9$ cm. Giá trị $\cos A$ là :

(A) $\frac{2}{3}$; (B) $\frac{1}{3}$; (C) $-\frac{2}{3}$; (D) $\frac{1}{2}$.

22. Cho hai điểm $A = (1 ; 2)$ và $B = (3 ; 4)$. Giá trị của $\overrightarrow{AB}^2$ là :

(A) 4 ; (B) $4\sqrt{2}$; (C) $6\sqrt{2}$; (D) 8.

http://sachviet.edu.vn

23. Cho hai vectơ $\vec{a} = (4 ; 3)$ và $\vec{b} = (1 ; 7)$. Góc giữa hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ là :

(A) 90° ;

(B) 60° ;

(C) 45° ;

(D) 30°.

24. Cho hai điểm $M = (1 ; -2)$ và $N = (-3 ; 4)$. Khoảng cách giữa hai điểm M và N là :

(A) 4 ;

(B) 6 ;

(C) $3\sqrt{6}$;

(D) $2\sqrt{13}$.

25. Tam giác ABC có $A = (-1 ; 1)$; $B = (1 ; 3)$ và $C = (1 ; -1)$.

Trong các cách phát biểu sau đây, hãy chọn cách phát biểu đúng.

(A) ABC là tam giác có ba cạnh bằng nhau ;

(B) ABC là tam giác có ba góc đều nhọn ;

(C) ABC là tam giác cân tại B (có $BA = BC$) ;

(D) ABC là tam giác vuông cân tại A.

26. Cho tam giác ABC có $A = (10 ; 5)$, $B = (3 ; 2)$ và $C = (6 ; -5)$. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

(A) ABC là tam giác đều ;

(B) ABC là tam giác vuông cân tại B ;

(C) ABC là tam giác vuông cân tại A ;

(D) ABC là tam giác có góc tù tại A.

27. Tam giác ABC vuông cân tại A và nội tiếp trong đường tròn tâm O bán kính R. Gọi r là bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC. Khi đó tỉ số $\frac{R}{r}$ bằng :

(A) $1+\sqrt{2}$;

(B) $\frac{2+\sqrt{2}}{2}$;

(C) $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$;

(D) $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$.

28. Tam giác ABC có $AB = 9$ cm, $AC = 12$ cm và $BC = 15$ cm. Khi đó đường trung tuyến AM của tam giác có độ dài là :

(A) 8 cm ;

(B) 10 cm ;

(C) 9 cm ;

(D) 7,5 cm.

http://sachviet.edu.vn

29. Tam giác ABC có $BC = a$, $CA = b$, $AB = c$ và có diện tích S. Nếu tăng cạnh BC lên 2 lần đồng thời tăng cạnh CA lên 3 lần và giữ nguyên độ lớn của góc C thì khi đó diện tích của tam giác mới được tạo nên bằng :

(A) $2S$; (B) $3S$; (C) $4S$; (D) $6S$.

30. Cho tam giác DEF có $DE = DF = 10$ cm và $EF = 12$ cm. Gọi I là trung điểm của cạnh EF. Đoạn thẳng DI có độ dài là :

(A) 6,5 cm ; (B) 7 cm ; (C) 8 cm ; (D) 4 cm.

Bạn có biết

Người tìm ra sao Hải Vương (Neptune) chỉ nhờ các phép tính về quỹ đạo các hành tinh

Nhà thiên văn học U-banh Lơ-ve-ri-ê (*Urbain Leverrier*, 1811-1877) sinh ra trong một gia đình công chức nhỏ tại vùng Noóc-măng-đi nước Pháp. Ông học ở trường Bách khoa và được giữ lại tiếp tục sự nghiệp nghiên cứu khoa học và giảng dạy ở đó. Ông đã say sưa thích thú tính toán chuyển động của các sao chổi và của các hành tinh, nhất là sao Thuỷ (*Mercure*). Với những thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc về thiên văn học, ông được nhận danh hiệu Viện sĩ Hàn lâm Pháp khi ông tròn 34 tuổi.

Vào thời kì bấy giờ, các nhà thiên văn đang tranh luận sôi nổi về "điều bí mật"

http://sachviet.edu.vn

của sao Thiên Vương (*Uranus*) vì hành tinh này không phục tùng theo những định luật về chuyển động của các hành tinh do Giô-han Kê-ple (*Johannes Kepler*, 1571-1630) nêu ra và không theo đúng định luật vạn vật hấp dẫn của I-sắc Niu-tơn (*Isaac Newton*, 1642-1727). Điều bí ẩn là vị trí của sao Thiên Vương trên bầu trời không bao giờ phù hợp với những tiên đoán dựa vào các phép tính của các nhà thiên văn thời bấy giờ. Nhà thiên văn học trẻ tuổi Lơ-ve-ri-ê muốn nghiên cứu tìm hiểu điều bí ẩn này và tự đặt câu hỏi tại sao sao Thiên Vương lại không tuân theo những quy luật chuyển động của các thiên thể. Một số nhà thiên văn thời bấy giờ đã dự đoán rằng con đường đi của sao Thiên Vương bị sức hút của sao Mộc (*Jupiter*) hay sao Thổ (Saturne) quấy nhiễu. Khi đó riêng Lơ-ve-ri-ê đã nêu lên một giả thuyết hết sức táo bạo, dựa vào các phép tính mà ông đã thực hiện. Ông cho rằng sao Thiên Vương không ngoan ngoãn theo tiên đoán của các nhà thiên văn có lẽ do bị ảnh hưởng bởi một hành tinh khác chưa được biết đến ở xa Mặt Trời hơn sao Thiên Vương. Hành tinh này đã tác động lên sao Thiên Vương làm cho nó có những nhiễu loạn khó có thể quan sát được. Lơ-ve-ri-ê đã kiên nhẫn tính toán làm việc trong phòng suốt hai tuần liền, với biết bao công thức, nhìn vào ai cũng cảm thấy chóng mặt. Cuối cùng chỉ dựa vào thuần tuý các phép tính, Lơ-ve-ri-ê xác nhận rằng có sự hiện diện của một hành tinh chưa biết tên. Vào thời gian đó, ở Pháp vì đài Thiên văn Pa-ri không đủ mạnh, nên không thể nhìn được hành tinh đó. Ngay sau đó, Lơ-ve-ri-ê phải nhờ nhà thiên văn Gan (*Galle*) ở đài quan sát Bec-lin xem xét hộ. Ngày 23 tháng 9 năm 1846, Gan đã hướng kính thiên văn về khu vực bầu trời đã được Lơ-ve-ri-ê chỉ định và vui mừng tìm thấy một hành tinh chưa có tên trên danh mục. Như vậy sức mạnh của tài năng con người lại được thể hiện một cách xuất sắc qua việc khám phá ra hành tinh mới này. Mọi người đều thán phục, chúc mừng cuộc khám phá thành công tốt đẹp này và cho rằng Lơ-ve-ri-ê đã phát hiện ra một hành tinh mới chỉ nhờ vào đầu chiếc bút chì của mình (!). Đây là một bài toán rất khó, nó không giống bài toán tìm ngày, giờ, địa điểm xuất hiện nhật thực, nguyệt thực vì các chi tiết chỉ biết phỏng chừng thông qua các nhiễu loạn, do tác động của một vật chưa biết, người ta cần phải tìm quỹ đạo và khối lượng của hành tinh đó, cần xác định được khoảng cách của nó tới Mặt Trời và các hành tinh khác v.v... Hành tinh mới này được đặt tên là sao Hải Vương (*Neptune*). Cũng vào thời điểm đó nhà thiên văn học người Anh là A-đam (*Adam*) cũng phát hiện ra hành tinh đó và người này không biết đến công trình của người kia. Tuy vậy, Lơ-ve-ri-ê vẫn được xem là người đầu tiên phát hiện ra sao Hải Vương và sau đó ông được nhận học vị Giáo sư Đại học Xoóc-bon đồng thời được nhận Huy chương Bắc đẩu bội tinh. Năm 1853 U-banh Lơ-ve-ri-ê được Hoàng đế Na-pô-lê-ông (*Napoléon*) Đệ Tam phong chức Giám đốc Đài quan sát Pa-ri. Ông mất năm 1877. Các nhà thiên văn học trên thế giới đã đánh giá cao phát minh quan trọng này của Lơ-ve-ri-ê.

http://sachviet.edu.vn

CHƯƠNG III

PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

- **Phương trình đường thẳng**
- **Phương trình đường tròn**
- **Phương trình đường elip**

Trong chương này chúng ta sử dụng phương pháp toạ độ để tìm hiểu về đường thẳng, đường tròn và đường elip.



Đường thẳng Đường tròn Đường elip

Hình 3.1

http://sachviet.edu.vn

§1. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

1. Vectơ chỉ phương của đường thẳng

1 Trong mặt phẳng *Oxy* cho đường thẳng Δ là đồ thị của hàm số $y = \frac{1}{2}x$.

a) Tìm tung độ của hai điểm M_0 và M nằm trên Δ, có hoành độ lần lượt là 2 và 6.

b) Cho vectơ $\vec{u} = (2 ; 1)$. Hãy chứng tỏ $\overrightarrow{M_0M}$ cùng phương với $\vec{u}$.



Hình 3.2

Định nghĩa

Vectơ $\vec{u}$ được gọi là ***vectơ chỉ phương*** *của đường thẳng Δ nếu $\vec{u} \neq \vec{0}$ và giá của $\vec{u}$ song song hoặc trùng với Δ.*

Nhận xét

– Nếu $\vec{u}$ là một vectơ chỉ phương của đường thẳng Δ thì $k\vec{u}$ $(k \neq 0)$ cũng là một vectơ chỉ phương của Δ. Do đó một đường thẳng có vô số vectơ chỉ phương.

– Một đường thẳng hoàn toàn được xác định nếu biết một điểm và một vectơ chỉ phương của đường thẳng đó.

http://sachviet.edu.vn

2. Phương trình tham số của đường thẳng

a) Định nghĩa

Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M_0(x_0 ; y_0)$ và nhận $\vec{u} = (u_1 ; u_2)$ làm vectơ chỉ phương. Với mỗi điểm $M(x ; y)$ bất kì trong mặt phẳng, ta có $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0 ; y - y_0)$. Khi đó

$M \in \Delta \Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M}$ cùng phương với $\vec{u} \Leftrightarrow \overrightarrow{M_0M} = t\vec{u}$



Hình 3.3

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - x_0 = tu_1 \\ y - y_0 = tu_2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 + tu_1 \\ y = y_0 + tu_2 \end{cases} \quad (1)$$

Hệ phương trình (1) được gọi là *phương trình tham số* của đường thẳng Δ, trong đó t là *tham số*.

Cho t một giá trị cụ thể thì ta xác định được một điểm trên đường thẳng Δ.

▲2 Hãy tìm một điểm có toạ độ xác định và một vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình tham số

$$\begin{cases} x = 5 - 6t \\ y = 2 + 8t. \end{cases}$$

b) Liên hệ giữa vectơ chỉ phương và hệ số góc của đường thẳng

Cho đường thẳng Δ có phương trình tham số

$$\begin{cases} x = x_0 + tu_1 \\ y = y_0 + tu_2. \end{cases}$$

Nếu $u_1 \neq 0$ thì từ phương trình tham số của Δ ta có

$$\begin{cases} t = \dfrac{x - x_0}{u_1} \\ y - y_0 = tu_2 \end{cases}$$

http://sachviet.edu.vn

suy ra $y - y_0 = \frac{u_2}{u_1}(x - x_0)$.

Đặt $k = \frac{u_2}{u_1}$ ta được $y - y_0 = k(x - x_0)$.



Hình 3.4

Gọi A là giao điểm của Δ với trục hoành, Av là tia thuộc Δ ở về nửa mặt phẳng toạ độ phía trên (chứa tia Oy). Đặt $\alpha = \widehat{xAv}$, ta thấy $k = \tan\alpha$. Số k chính là *hệ số góc* của đường thẳng Δ mà ta đã biết ở lớp 9.

Như vậy nếu đường thẳng Δ có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (u_1 ; u_2)$ với $u_1 \neq 0$ thì Δ có hệ số góc $k = \frac{u_2}{u_1}$.

3 Tính hệ số góc của đường thẳng d có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (-1 ; \sqrt{3})$.

Ví dụ. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua hai điểm $A(2 ; 3)$ và $B(3 ; 1)$. Tính hệ số góc của d.

GIẢI

Vì d đi qua A và B nên d có vectơ chỉ phương $\overrightarrow{AB} = (1 ; -2)$

Phương trình tham số của d là $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = 3 - 2t. \end{cases}$

Hệ số góc của d là $k = \frac{u_2}{u_1} = \frac{-2}{1} = -2$.

http://sachviet.edu.vn

3. Vectơ pháp tuyến của đường thẳng

▲4 Cho đường thẳng Δ có phương trình $\begin{cases} x = -5 + 2t \\ y = 4 + 3t \end{cases}$ và vectơ $\vec{n} = (3 ; -2)$. Hãy chứng tỏ $\vec{n}$ vuông góc với vectơ chỉ phương của Δ.

> ***Định nghĩa***
>
> *Vectơ $\vec{n}$ được gọi là* ***vectơ pháp tuyến*** *của đường thẳng Δ nếu $\vec{n} \neq \vec{0}$ và $\vec{n}$ vuông góc với vectơ chỉ phương của Δ.*

Nhận xét

– Nếu $\vec{n}$ là một vectơ pháp tuyến của đường thẳng Δ thì $k\vec{n}$ $(k \neq 0)$ cũng là một vectơ pháp tuyến của Δ. Do đó một đường thẳng có vô số vectơ pháp tuyến.

– Một đường thẳng hoàn toàn được xác định nếu biết một điểm và một vectơ pháp tuyến của nó.

4. Phương trình tổng quát của đường thẳng

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy cho đường thẳng Δ đi qua điểm $M_0(x_0 ; y_0)$ và nhận $\vec{n}(a ; b)$ làm vectơ pháp tuyến.

Với mỗi điểm $M(x ; y)$ bất kì thuộc mặt phẳng, ta có : $\overrightarrow{M_0M} = (x - x_0 ; y - y_0)$.



Hình 3.5

Khi đó : $M(x ; y) \in \Delta \Leftrightarrow \vec{n} \perp \overrightarrow{M_0M}$

$$\Leftrightarrow a(x - x_0) + b(y - y_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow ax + by + (-ax_0 - by_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow ax + by + c = 0$$

với $c = -ax_0 - by_0$.

http://sachviet.edu.vn

a) Định nghĩa

Phương trình $ax + by + c = 0$ với a và b không đồng thời bằng 0, được gọi là ***phương trình tổng quát*** *của đường thẳng.*

Nhận xét. Nếu đường thẳng Δ có phương trình là $ax + by + c = 0$ thì Δ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (a ; b)$ và có vectơ chỉ phương là $\vec{u} = (-b ; a)$.

5 Hãy chứng minh nhận xét trên.

b) Ví dụ. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng Δ đi qua hai điểm $A(2 ; 2)$ và $B(4 ; 3)$.

GIẢI

Đường thẳng Δ đi qua hai điểm A, B nên có vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (2 ; 1)$. Từ đó suy ra Δ có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (-1 ; 2)$. Vậy đường thẳng Δ có phương trình tổng quát là :

$$(-1).(x - 2) + 2(y - 2) = 0$$

hay $$x - 2y + 2 = 0.$$

6 Hãy tìm toạ độ của vectơ chỉ phương của đường thẳng có phương trình :

$$3x + 4y + 5 = 0.$$

c) Các trường hợp đặc biệt

Cho đường thẳng Δ có phương trình tổng quát $ax + by + c = 0$ (1)

• Nếu $a = 0$ phương trình (1) trở thành

$by + c = 0$ hay $y = -\dfrac{c}{b}$.

Khi đó đường thẳng Δ vuông góc với trục Oy tại điểm $\left(0 ; -\dfrac{c}{b}\right)$ (h.3.6).



Hình 3.6

http://sachviet.edu.vn

• Nếu $b = 0$ phương trình (1) trở thành $ax + c = 0$ hay $x = -\frac{c}{a}$.

Khi đó đường thẳng Δ vuông góc với trục Ox tại điểm $\left(-\frac{c}{a}; 0\right)$ (h.3.7).



Hình 3.7

• Nếu $c = 0$ phương trình (1) trở thành $ax + by = 0$.

Khi đó đường thẳng Δ đi qua gốc toạ độ O (h.3.8).



Hình 3.8

• Nếu a, b, c đều khác 0 ta có thể đưa phương trình (1) về dạng

$$\frac{x}{a_0} + \frac{y}{b_0} = 1 \qquad (2)$$

với $a_0 = -\frac{c}{a}$, $b_0 = -\frac{c}{b}$.



Hình 3.9

Phương trình (2) được gọi là *phương trình đường thẳng theo đoạn chắn*, đường thẳng này cắt Ox và Oy lần lượt tại $M(a_0; 0)$ và $N(0; b_0)$ (h.3.9).

http://sachviet.edu.vn

7 Trong mặt phẳng Oxy, hãy vẽ các đường thẳng có phương trình sau đây :

$d_1 : x - 2y = 0$;

$d_2 : x = 2$;

$d_3 : y + 1 = 0$;

$d_4 : \frac{x}{8} + \frac{y}{4} = 1$.

5. Vị trí tương đối của hai đường thẳng

Xét hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 có phương trình tổng quát lần lượt là

$$a_1x + b_1y + c_1 = 0 \quad \text{và} \quad a_2x + b_2y + c_2 = 0.$$

Toạ độ giao điểm của Δ_1 và Δ_2 là nghiệm của hệ phương trình :

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0. \end{cases} \quad \text{(I)}$$

Ta có các trường hợp sau :

a) Hệ (I) có một nghiệm $(x_0 ; y_0)$, khi đó Δ_1 cắt Δ_2 tại điểm $M_0(x_0 ; y_0)$.

b) Hệ (I) có vô số nghiệm, khi đó Δ_1 trùng với Δ_2.

c) Hệ (I) vô nghiệm, khi đó Δ_1 và Δ_2 không có điểm chung, hay Δ_1 song song với Δ_2.

Ví dụ. Cho đường thẳng d có phương trình $x - y + 1 = 0$, xét vị trí tương đối của d với mỗi đường thẳng sau :

$\Delta_1 : 2x + y - 4 = 0$;

$\Delta_2 : x - y - 1 = 0$;

$\Delta_3 : 2x - 2y + 2 = 0$.

http://sachviet.edu.vn

GIẢI

a) Xét d và Δ_1, hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ 2x + y - 4 = 0 \end{cases}$$

có nghiệm (1 ; 2).

Vậy d cắt Δ_1 tại $M(1 ; 2)$ (h.3.10).



Hình 3.10

b) Xét d và Δ_2, hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y + 1 = 0 \\ x - y - 1 = 0 \end{cases}$$ vô nghiệm.

Vậy $d \,//\, \Delta_2$ (h.3.11).



Hình 3.11

c) Xét d và Δ_3, hệ phương trình

$$\begin{cases} x - y + 1 = 0 & (1) \\ 2x - 2y + 2 = 0 & (2) \end{cases}$$

có vô số nghiệm (vì các hệ số của (1) và (2) tỉ lệ).

Vậy $d \equiv \Delta_3$ (h.3.12).



Hình 3.12

8 Xét vị trí tương đối của đường thẳng $\Delta : x - 2y + 1 = 0$ với mỗi đường thẳng sau :

$d_1 : -3x + 6y - 3 = 0$;

$d_2 : y = -2x$;

$d_3 : 2x + 5 = 4y$.

http://sachviet.edu.vn

6. Góc giữa hai đường thẳng

9 Cho hình chữ nhật $ABCD$ có tâm I và các cạnh $AB = 1$, $AD = \sqrt{3}$. Tính số đo các góc $\widehat{AID}$ và $\widehat{DIC}$.



Hình 3.13

Hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 cắt nhau tạo thành bốn góc. Nếu Δ_1 không vuông góc với Δ_2 thì góc nhọn trong số bốn góc đó được gọi là *góc giữa hai đường thẳng* Δ_1 và Δ_2. Nếu Δ_1 vuông góc với Δ_2 thì ta nói góc giữa Δ_1 và Δ_2 bằng 90°. Trường hợp Δ_1 và Δ_2 song song hoặc trùng nhau thì ta quy ước góc giữa Δ_1 và Δ_2 bằng 0°. Như vậy góc giữa hai đường thẳng luôn bé hơn hoặc bằng 90°.

Góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 được kí hiệu là $\left(\widehat{\Delta_1, \Delta_2}\right)$ hoặc (Δ_1, Δ_2).

Cho hai đường thẳng

$$\Delta_1 : a_1x + b_1y + c_1 = 0,$$

$$\Delta_2 : a_2x + b_2y + c_2 = 0.$$

Đặt $\varphi = \left(\widehat{\Delta_1, \Delta_2}\right)$ thì ta thấy φ bằng hoặc bù với góc giữa $\vec{n_1}$ và $\vec{n_2}$ trong đó $\vec{n_1}$, $\vec{n_2}$ lần lượt là vectơ pháp tuyến của Δ_1 và Δ_2. Vì $\cos\varphi \geq 0$ nên ta suy ra

$$\cos\varphi = \left|\cos\left(\vec{n_1}, \vec{n_2}\right)\right| = \frac{\left|\vec{n_1}.\vec{n_2}\right|}{\left|\vec{n_1}\right|\left|\vec{n_2}\right|}.$$

Vậy

$$\boxed{\cos\varphi = \frac{\left|a_1a_2 + b_1b_2\right|}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}\ \sqrt{a_2^2 + b_2^2}}.}$$



Hình 3.14

http://sachviet.edu.vn

☞ *Chú ý*

- $\Delta_1 \perp \Delta_2 \Leftrightarrow \vec{n_1} \perp \vec{n_2} \Leftrightarrow a_1a_2 + b_1b_2 = 0.$
- Nếu Δ_1 và Δ_2 có phương trình $y = k_1x + m_1$ và $y = k_2x + m_2$ thì

$$\boxed{\Delta_1 \perp \Delta_2 \Leftrightarrow k_1.k_2 = -1.}$$

7. Công thức tính khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng

*Trong mặt phẳng Oxy cho đường thẳng Δ có phương trình $ax + by + c = 0$ và điểm $M_0(x_0 ; y_0)$. **Khoảng cách** từ điểm M_0 đến đường thẳng Δ, kí hiệu là $d(M_0, \Delta)$, được tính bởi công thức*

$$\boxed{d(M_0, \Delta) = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.}$$

CHỨNG MINH

Phương trình tham số của đường thẳng m đi qua $M_0(x_0; y_0)$ và vuông góc với đường thẳng Δ là :

$$\begin{cases} x = x_0 + ta \\ y = y_0 + tb \end{cases}$$



Hình 3.15

trong đó $\vec{n}(a; b)$ là vectơ pháp tuyến của Δ.

Giao điểm H của đường thẳng m và Δ ứng với giá trị của tham số là nghiệm t_H của phương trình :

$$a(x_0 + ta) + b(y_0 + tb) + c = 0.$$

Ta có $$t_H = -\frac{ax_0 + by_0 + c}{a^2 + b^2}.$$

Vậy điểm $H = (x_0 + t_Ha;\ y_0 + t_Hb).$

http://sachviet.edu.vn

Từ đó suy ra $d(M_0, \Delta) = M_0H = \sqrt{(x_H - x_0)^2 + (y_H - y_0)^2}$

$$= \sqrt{(a^2 + b^2)t_H^2} = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}.$$

10 Tính khoảng cách từ các điểm $M(-2 ; 1)$ và $O(0 ; 0)$ đến đường thẳng Δ có phương trình $3x - 2y - 1 = 0$.

Câu hỏi và bài tập

1. Lập phương trình tham số của đường thẳng d trong mỗi trường hợp sau :

a) d đi qua điểm $M(2 ; 1)$ và có vectơ chỉ phương $\vec{u} = (3 ; 4)$;

b) d đi qua điểm $M(-2 ; 3)$ và có vectơ pháp tuyến là $\vec{n} = (5 ; 1)$.

2. Lập phương trình tổng quát của đường thẳng Δ trong mỗi trường hợp sau :

a) Δ đi qua $M(-5 ; -8)$ và có hệ số góc $k = -3$;

b) Δ đi qua hai điểm $A(2 ; 1)$ và $B(-4 ; 5)$.

3. Cho tam giác ABC, biết $A(1 ; 4)$, $B(3 ; -1)$ và $C(6 ; 2)$.

a) Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng AB, BC và CA ;

b) Lập phương trình tổng quát của đường cao AH và trung tuyến AM.

4. Viết phương trình tổng quát của đường thẳng đi qua điểm $M(4 ; 0)$ và điểm $N(0 ; -1)$.

5. Xét vị trí tương đối của các cặp đường thẳng d_1 và d_2 sau đây :

a) $d_1 : 4x - 10y + 1 = 0$ và $d_2 : x + y + 2 = 0$;

b) $d_1 : 12x - 6y + 10 = 0$ và $d_2 : \begin{cases} x = 5 + t \\ y = 3 + 2t \end{cases}$;

c) $d_1 : 8x + 10y - 12 = 0$ và $d_2 : \begin{cases} x = -6 + 5t \\ y = 6 - 4t. \end{cases}$

6. Cho đường thẳng d có phương trình tham số $\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 3 + t. \end{cases}$

Tìm điểm M thuộc d và cách điểm $A(0 ; 1)$ một khoảng bằng 5.

http://sachviet.edu.vn

7. Tìm số đo của góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 lần lượt có phương trình

$$d_1 : 4x - 2y + 6 = 0 \text{ và } d_2 : x - 3y + 1 = 0.$$

8. Tìm khoảng cách từ một điểm đến đường thẳng trong các trường hợp sau :

a) $A(3 ; 5)$, $\Delta : 4x + 3y + 1 = 0$;

b) $B(1 ; -2)$, $d : 3x - 4y - 26 = 0$;

c) $C(1 ; 2)$, $m : 3x + 4y - 11 = 0$.

9. Tìm bán kính của đường tròn tâm $C(-2 ; -2)$ tiếp xúc với đường thẳng $\Delta : 5x + 12y - 10 = 0$.

http://sachviet.edu.vn

§2. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG TRÒN

1. Phương trình đường tròn có tâm và bán kính cho trước



Hình 3.16

Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) tâm $I(a\,;\,b)$, bán kính R (h.3.16).

Ta có

$$M(x\,;\,y) \in (C) \Leftrightarrow IM = R$$
$$\Leftrightarrow \sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2} = R$$
$$\Leftrightarrow (x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2.$$

http://sachviet.edu.vn

Phương trình $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$ được gọi là *phương trình đường tròn tâm* $I(a; b)$ *bán kính* R.

Chẳng hạn, phương trình đường tròn tâm $I(2 ; -3)$ bán kính $R = 5$ là :

$$(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 25.$$

☞ ***Chú ý.*** Phương trình đường tròn có tâm là gốc toạ độ O và có bán kính R là :

$$x^2 + y^2 = R^2.$$

1 Cho hai điểm $A(3 ; -4)$ và $B(-3 ; 4)$.

Viết phương trình đường tròn (C) nhận AB làm đường kính.

2. Nhận xét

Phương trình đường tròn $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$ có thể được viết dưới dạng $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$, trong đó $c = a^2 + b^2 - R^2$.

Ngược lại, phương trình $x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0$ *là phương trình của đường tròn* (C) khi và chỉ khi $a^2 + b^2 - c > 0$. Khi đó đường tròn (C) có tâm $I(a ; b)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 - c}$.

2 Hãy cho biết phương trình nào trong các phương trình sau đây là phương trình đường tròn :

$$2x^2 + y^2 - 8x + 2y - 1 = 0 ;$$

$$x^2 + y^2 + 2x - 4y - 4 = 0 ;$$

$$x^2 + y^2 - 2x - 6y + 20 = 0 ;$$

$$x^2 + y^2 + 6x + 2y + 10 = 0.$$

3. Phương trình tiếp tuyến của đường tròn



Hình 3.17

http://sachviet.edu.vn

Cho điểm $M_0(x_0 ; y_0)$ nằm trên đường tròn (C) tâm $I(a ; b)$. Gọi Δ là tiếp tuyến với (C) tại M_0.

Ta có M_0 thuộc Δ và vectơ $\overrightarrow{IM_0} = (x_0 - a ; y_0 - b)$ là vectơ pháp tuyến của Δ.

Do đó Δ có phương trình là :

$$\boxed{(x_0 - a)(x - x_0) + (y_0 - b)(y - y_0) = 0} \qquad (2)$$

Phương trình (2) là *phương trình tiếp tuyến* của đường tròn $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$ tại điểm M_0 nằm trên đường tròn.

Ví dụ. Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm $M(3 ; 4)$ thuộc đường tròn

$$(C) : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 8.$$

GIẢI

(C) có tâm $I(1 ; 2)$, vậy phương trình tiếp tuyến với (C) tại $M(3 ; 4)$ là :

$$(3 - 1)(x - 3) + (4 - 2)(y - 4) = 0$$
$$\Leftrightarrow \quad 2x + 2y - 14 = 0$$
$$\Leftrightarrow \quad x + y - 7 = 0.$$

Câu hỏi và bài tập

1. Tìm tâm và bán kính của các đường tròn sau :

a) $x^2 + y^2 - 2x - 2y - 2 = 0$;

b) $16x^2 + 16y^2 + 16x - 8y - 11 = 0$;

c) $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$.

2. Lập phương trình đường tròn $(\mathscr{C})$ trong các trường hợp sau :

a) $(\mathscr{C})$ có tâm $I(-2 ; 3)$ và đi qua $M(2 ; -3)$;

b) $(\mathscr{C})$ có tâm $I(-1 ; 2)$ và tiếp xúc với đường thẳng $x - 2y + 7 = 0$;

c) $(\mathscr{C})$ có đường kính AB với $A = (1 ; 1)$ và $B = (7 ; 5)$.

http://sachviet.edu.vn

3. Lập phương trình đường tròn đi qua ba điểm

a) $A(1 ; 2)$, $B(5 ; 2)$, $C(1 ; -3)$;

b) $M(-2 ; 4)$, $N(5 ; 5)$, $P(6 ; -2)$.

4. Lập phương trình đường tròn tiếp xúc với hai trục toạ độ Ox, Oy và đi qua điểm $M(2 ; 1)$.

5. Lập phương trình của đường tròn tiếp xúc với các trục toạ độ và có tâm ở trên đường thẳng $4x - 2y - 8 = 0$.

6. Cho đường tròn $(\mathscr{C})$ có phương trình

$$x^2 + y^2 - 4x + 8y - 5 = 0.$$

a) Tìm toạ độ tâm và bán kính của $(\mathscr{C})$;

b) Viết phương trình tiếp tuyến với $(\mathscr{C})$ đi qua điểm $A(-1 ; 0)$;

c) Viết phương trình tiếp tuyến với $(\mathscr{C})$ vuông góc với đường thẳng

$$3x - 4y + 5 = 0.$$

http://sachviet.edu.vn

§3. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG ELIP

1. Định nghĩa đường elip

a)



b)

Hình 3.18

http://sachviet.edu.vn

▲1 Quan sát mặt nước trong cốc nước cầm nghiêng (h.3.18a). Hãy cho biết đường được đánh dấu bởi mũi tên có phải là đường tròn hay không ?

▲2 Hãy cho biết bóng của một đường tròn trên một mặt phẳng (h.3.18b) có phải là một đường tròn hay không ?

Đóng hai chiếc đinh cố định tại hai điểm F_1 và F_2 (h.3.19). Lấy một vòng dây kín không đàn hồi có độ dài lớn hơn $2F_1F_2$. Quàng vòng dây đó qua hai chiếc đinh và kéo căng tại một điểm M nào đó. Đặt đầu bút chì tại điểm M rồi di chuyển sao cho dây luôn căng. Đầu bút chì vạch nên một đường mà ta gọi là đường elip.



Hình 3.19

Định nghĩa

*Cho hai điểm cố định F_1, F_2 và một độ dài không đổi 2a lớn hơn F_1F_2. **Elip** là tập hợp các điểm M trong mặt phẳng sao cho*

$$F_1M + F_2M = 2a.$$

*Các điểm F_1 và F_2 gọi là các **tiêu điểm** của elip. Độ dài $F_1F_2 = 2c$ gọi là **tiêu cự** của elip.*

http://sachviet.edu.vn

2. Phương trình chính tắc của elip



Hình 3.20

Cho elip (E) có các tiêu điểm F_1 và F_2. Điểm M thuộc elip khi và chỉ khi $F_1M + F_2M = 2a$. Chọn hệ trục toạ độ Oxy sao cho $F_1 = (-c\,;0)$ và $F_2 = (c\,;0)$. Khi đó người ta chứng minh được :

$$M(x\,;y) \in (E) \Leftrightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \qquad (1)$$

trong đó $b^2 = a^2 - c^2$.

Phương trình (1) gọi là *phương trình chính tắc* của elip.

3 Trong phương trình (1) hãy giải thích vì sao ta luôn đặt được $b^2 = a^2 - c^2$.

3. Hình dạng của elip

Xét elip (E) có phương trình (1) :

a) Nếu điểm $M(x\,;y)$ thuộc (E) thì các điểm $M_1(-x\,;y)$, $M_2(x\,;-y)$ và $M_3(-x\,;-y)$ cũng thuộc (E) (h.3.21).

Vậy (E) có các trục đối xứng là Ox, Oy và có tâm đối xứng là gốc O.



Hình 3.21

http://sachviet.edu.vn

b) Thay $y = 0$ vào (1) ta có $x = \pm a$, suy ra (E) cắt Ox tại hai điểm $A_1(-a\,;\,0)$ và $A_2(a\,;\,0)$. Tương tự thay $x = 0$ vào (1) ta được $y = \pm b$, vậy (E) cắt Oy tại hai điểm $B_1(0\,;-b)$ và $B_2(0\,;\,b)$.

Các điểm A_1, A_2, B_1 và B_2 gọi là *các đỉnh* của elip.

Đoạn thẳng A_1A_2 gọi là *trục lớn*, đoạn thẳng B_1B_2 gọi là *trục nhỏ* của elip.

Ví dụ. Elip $(E): \dfrac{x^2}{9}+\dfrac{y^2}{1}=1$ có các đỉnh là $A_1(-3\,;\,0)$, $A_2(3\,;\,0)$, $B_1(0\,;-1)$, $B_2(0\,;\,1)$ và $A_1A_2 = 6$ là trục lớn còn $B_1B_2 = 2$ là trục nhỏ.

4 Hãy xác định toạ độ các tiêu điểm và vẽ hình elip trong ví dụ trên.

4. Liên hệ giữa đường tròn và đường elip

a) Từ hệ thức $b^2 = a^2 - c^2$ ta thấy nếu tiêu cự của elip càng nhỏ thì b càng gần bằng a, tức là trục nhỏ của elip càng gần bằng trục lớn. Lúc đó elip có dạng gần như đường tròn.

b) Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn $(\mathscr{C})$ có phương trình

$$x^2 + y^2 = a^2.$$

Với mỗi điểm $M(x\,;\,y)$ thuộc đường tròn ta xét điểm $M'(x'\,;\,y')$ sao cho

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = \dfrac{b}{a}y \end{cases} \quad (\text{với } 0 < b < a) \text{ (h.3.22)}$$

thì tập hợp các điểm M' có toạ độ thoả mãn phương trình

$\dfrac{x'^2}{a^2}+\dfrac{y'^2}{b^2}=1$ là một elip (E).

Khi đó ta nói đường tròn $(\mathscr{C})$ được co thành elip (E).



Hình 3.22

http://sachviet.edu.vn

Câu hỏi và bài tập

1. Xác định độ dài các trục, toạ độ các tiêu điểm, toạ độ các đỉnh của các elip có phương trình sau :

a) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$;

b) $4x^2+9y^2=1$;

c) $4x^2+9y^2=36$.

2. Lập phương trình chính tắc của elip, biết

a) Độ dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 8 và 6 ;

b) Độ dài trục lớn bằng 10 và tiêu cự bằng 6.

3. Lập phương trình chính tắc của elip trong các trường hợp sau :

a) Elip đi qua các điểm $M(0\,;\,3)$ và $N\left(3\,;\,-\frac{12}{5}\right)$;

b) Elip có một tiêu điểm là $F_1(-\sqrt{3}\,;\,0)$ và điểm $M\left(1\,;\,\frac{\sqrt{3}}{2}\right)$ nằm trên elip.

4. Để cắt một bảng hiệu quảng cáo hình elip có trục lớn là 80 cm và trục nhỏ là 40 cm từ một tấm ván ép hình chữ nhật có kích thước 80 cm × 40 cm, người ta vẽ hình elip đó lên tấm ván ép như hình 3.19. Hỏi phải ghim hai cái đinh cách các mép tấm ván ép bao nhiêu và lấy vòng dây có độ dài là bao nhiêu ?

5. Cho hai đường tròn $\mathscr{C}_1(F_1\,;\,R_1)$ và $\mathscr{C}_2(F_2\,;\,R_2)$. $\mathscr{C}_1$ nằm trong $\mathscr{C}_2$ và $F_1 \neq F_2$. Đường tròn $\mathscr{C}$ thay đổi luôn tiếp xúc ngoài với $\mathscr{C}_1$ và tiếp xúc trong với $\mathscr{C}_2$. Hãy chứng tỏ rằng tâm M của đường tròn $\mathscr{C}$ di động trên một elip.

http://sachviet.edu.vn

Ba đường cônic và quỹ đạo của tàu vũ trụ



Hình 3.23

1. Khi cắt một mặt nón tròn xoay bởi một mặt phẳng không đi qua đỉnh và không vuông góc với trục của mặt nón, người ta nhận thấy ngoài đường elip ra, có thể còn hai loại đường khác nữa là parabol và hypebol (h.3.23). Các đường nói trên thường được gọi là *ba đường cônic* (do gốc tiếng Hi Lạp Konos nghĩa là mặt nón).

2. Dưới đây là vài ví dụ về hình ảnh của ba đường cônic trong đời sống hằng ngày :

   – Bóng của một quả bóng đá trên mặt sân thường có hình elip (h.3.24).

Hình 3.24

http://sachviet.edu.vn

– Tia nước từ vòi phun ở công viên thường là đường parabol (h.3.25).

Hình 3.25

– Bóng của đèn ngủ in trên tường có thể là đường hypebol (h.3.26).



Hình 3.26

3. Tàu vũ trụ được phóng lên từ Trái Đất luôn bay theo những quỹ đạo, quỹ đạo này thường là đường tròn, elip, parabol hoặc hypebol. Hình dạng của quỹ đạo phụ thuộc vào vận tốc của tàu vũ trụ (h.3.27). Ta có bảng tương ứng giữa tốc độ và quỹ đạo như sau.

http://sachviet.edu.vn

Tốc độ V_0 của tàu vũ trụ	Hình dạng quỹ đạo tàu vũ trụ
7,9 km/s	đường tròn
7,9 km/s < V_0 < 11,2 km/s	elip
11,2 km/s	Một phần của parabol
V_0 > 11,2 km/s	Một phần của hypebol

Ngoài ra người ta còn tính được các tốc độ vũ trụ tổng quát, nghĩa là tốc độ của các thiên thể chuyển động đối với các thiên thể khác dưới tác dụng của lực hấp dẫn tương hỗ. Ví dụ để phóng một tàu vũ trụ thoát li được Mặt Trăng trở về Trái Đất thì cần tạo cho tàu một tốc độ ban đầu là 2,38 km/s.



Hình 3.27

http://sachviet.edu.vn

Bạn có biết

Giô-han Kê-ple và quy luật chuyển động của các hành tinh



Hình 3.28

Giô-han Kê-ple (*Johannes Kepler*, 1571 - 1630) là nhà thiên văn người Đức. Ông là một trong những người đã đặt nền móng cho khoa học tự nhiên. Kê-ple sinh ra ở Vu-tem-be (*Wurtemberg*) trong một gia đình nghèo, 15 tuổi theo học trường dòng. Năm 1593 ông tốt nghiệp Học viện Thiên văn và Toán học vào loại xuất sắc và trở thành giáo sư trung học. Năm 1600 ông đến Pra-ha và cùng làm việc với nhà thiên văn nổi tiếng Ti-cô Bra.

Kê-ple nổi tiếng nhờ phát minh ra các định luật chuyển động của các hành tinh:

1. Các hành tinh chuyển động quanh Mặt Trời theo các quỹ đạo là các đường elip mà Mặt Trời là một tiêu điểm.

2. Đoạn thẳng nối từ Mặt Trời đến hành tinh quét được những diện tích bằng nhau trong những khoảng thời gian bằng nhau. Chẳng hạn nếu xem Mặt Trời là tiêu điểm F và nếu trong cùng một khoảng thời gian t, một hành tinh di chuyển từ M_1 đến M_2 hoặc từ M_1' đến M_2' thì diện tích hai hình FM_1M_2 và $FM_1'M_2'$ bằng nhau (h.3.28).

3. Nếu gọi T_1, T_2 lần lượt là thời gian để hai hành tinh bất kì bay hết một vòng quanh Mặt Trời và gọi a_1, a_2 lần lượt là độ dài nửa trục lớn của elip quỹ đạo của hai hành tinh trên thì ta luôn có

$$\frac{T_1^2}{a_1^3} = \frac{T_2^2}{a_2^3}.$$

Các định luật nói trên ngày nay trong thiên văn gọi là ba định luật Kê-ple.

http://sachviet.edu.vn

ÔN TẬP CHƯƠNG III

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Cho hình chữ nhật $ABCD$. Biết các đỉnh $A(5\ ;\ 1)$, $C(0\ ;\ 6)$ và phương trình $CD : x + 2y - 12 = 0$. Tìm phương trình các đường thẳng chứa các cạnh còn lại.

2. Cho $A(1\ ;\ 2)$, $B(-3\ ;\ 1)$ và $C(4\ ;\ -2)$. Tìm tập hợp các điểm M sao cho $MA^2 + MB^2 = MC^2$.

3. Tìm tập hợp các điểm cách đều hai đường thẳng

$\Delta_1 : 5x + 3y - 3 = 0$ và $\Delta_2 : 5x + 3y + 7 = 0$.

4. Cho đường thẳng $\Delta : x - y + 2 = 0$ và hai điểm $O(0\ ;\ 0)$, $A(2\ ;\ 0)$.

a) Tìm điểm đối xứng của O qua Δ;

b) Tìm điểm M trên Δ sao cho độ dài đường gấp khúc OMA ngắn nhất.

5. Cho ba điểm $A(4\ ;\ 3)$, $B(2\ ;\ 7)$ và $C(-3\ ;\ -8)$.

a) Tìm toạ độ của trọng tâm G và trực tâm H của tam giác ABC ;

b) Gọi T là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Chứng minh T, G và H thẳng hàng ;

c) Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.

6. Lập phương trình hai đường phân giác của các góc tạo bởi hai đường thẳng

$3x - 4y + 12 = 0$ và $12x + 5y - 7 = 0$.

7. Cho đường tròn $(\mathscr{C})$ có tâm $I(1\ ;\ 2)$ và bán kính bằng 3. Chứng minh rằng tập hợp các điểm M mà từ đó ta vẽ được hai tiếp tuyến với $(\mathscr{C})$ tạo với nhau một góc 60° là một đường tròn. Hãy viết phương trình đường tròn đó.

8. Tìm góc giữa hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 trong các trường hợp sau :

a) $\Delta_1 : 2x + y - 4 = 0$ và $\Delta_2 : 5x - 2y + 3 = 0$;

b) $\Delta_1 : y = -2x + 4$ và $\Delta_2 : y = \frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$.

http://sachviet.edu.vn

9. Cho elip $(E): \frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{9}=1$.

Tìm toạ độ các đỉnh, các tiêu điểm và vẽ elip đó.

10. Ta biết rằng Mặt Trăng chuyển động quanh Trái Đất theo một quỹ đạo là một elip mà Trái Đất là một tiêu điểm. Elip đó có chiều dài trục lớn và trục nhỏ lần lượt là 769 266 km và 768 106 km. Tính khoảng cách ngắn nhất và khoảng cách dài nhất từ Trái Đất đến Mặt Trăng, biết rằng các khoảng cách đó đạt được khi Trái Đất và Mặt Trăng nằm trên trục lớn của elip.

II. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1. Cho tam giác ABC có toạ độ các đỉnh là $A(1\ ;\ 2)$, $B(3\ ;\ 1)$ và $C(5\ ;\ 4)$. Phương trình nào sau đây là phương trình đường cao của tam giác vẽ từ A ?

(A) $2x+3y-8=0$;

(B) $3x-2y-5=0$;

(C) $5x-6y+7=0$;

(D) $3x-2y+5=0$.

2. Cho tam giác ABC với các đỉnh là $A(-1\ ;\ 1)$, $B(4\ ;\ 7)$ và $C(3\ ;\ -2)$, M là trung điểm của đoạn thẳng AB. Phương trình tham số của trung tuyến CM là :

(A) $\begin{cases} x=3+t \\ y=-2+4t \end{cases}$;

(B) $\begin{cases} x=3+t \\ y=-2-4t \end{cases}$;

(C) $\begin{cases} x=3-t \\ y=4+2t \end{cases}$;

(D) $\begin{cases} x=3+3t \\ y=-2+4t. \end{cases}$

3. Cho phương trình tham số của đường thẳng d : $\begin{cases} x=5+t \\ y=-9-2t. \end{cases}$

Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình tổng quát của (d) ?

(A) $2x+y-1=0$;

(B) $2x+3y+1=0$;

(C) $x+2y+2=0$;

(D) $x+2y-2=0$.

4. Đường thẳng đi qua điểm $M(1\ ;\ 0)$ và song song với đường thẳng $d: 4x+2y+1=0$ có phương trình tổng quát là :

(A) $4x+2y+3=0$;

(B) $2x+y+4=0$;

(C) $2x+y-2=0$;

(D) $x-2y+3=0$.

http://sachviet.edu.vn

5. Cho đường thẳng d có phương trình tổng quát : $3x + 5y + 2006 = 0$. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau :

(A) (d) có vectơ pháp tuyến $\vec{n} = (3 ; 5)$;

(B) (d) có vectơ chỉ phương $\vec{a} = (5 ; -3)$;

(C) (d) có hệ số góc $k = \frac{5}{3}$;

(D) (d) song song với đường thẳng $3x + 5y = 0$.

6. Bán kính của đường tròn tâm $I(0 ; -2)$ và tiếp xúc với đường thẳng $\Delta : 3x - 4y - 23 = 0$ là :

(A) 15 ; (B) 5 ;

(C) $\frac{3}{5}$; (D) 3.

7. Cho hai đường thẳng

$$d_1 : 2x + y + 4 - m = 0 \text{ và}$$

$$d_2 : (m + 3)x + y - 2m - 1 = 0.$$

d_1 song song với d_2 khi :

(A) $m = 1$; (B) $m = -1$;

(C) $m = 2$; (D) $m = 3$.

8. Cho $(d_1) : x + 2y + 4 = 0$ và $(d_2) : 2x - y + 6 = 0$. Số đo của góc giữa hai đường thẳng d_1 và d_2 là :

(A) 30° ; (B) 60° ;

(C) 45° ; (D) 90°.

9. Cho hai đường thẳng $\Delta_1 : x + y + 5 = 0$ và $\Delta_2 : y = -10$. Góc giữa Δ_1 và Δ_2 là :

(A) 45° ; (B) 30° ;

(C) $88^\circ 57' 52''$; (D) $1^\circ 13' 8''$.

10. Khoảng cách từ điểm $M(0 ; 3)$ đến đường thẳng $\Delta : x\cos\alpha + y\sin\alpha + 3(2 - \sin\alpha) = 0$ là :

(A) $\sqrt{6}$; (B) 6 ;

(C) $3\sin\alpha$; (D) $\frac{3}{\sin\alpha + \cos\alpha}$.

http://sachviet.edu.vn

11. Phương trình nào sau đây là phương trình đường tròn ?

(A) $x^2 + 2y^2 - 4x - 8y + 1 = 0$; (B) $4x^2 + y^2 - 10x - 6y - 2 = 0$;

(C) $x^2 + y^2 - 2x - 8y + 20 = 0$; (D) $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$.

12. Cho đường tròn $(C) : x^2 + y^2 + 2x + 4y - 20 = 0$.

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau :

(A) (C) có tâm $I(1 ; 2)$; (B) (C) có bán kính $R = 5$;

(C) (C) đi qua điểm $M(2 ; 2)$; (D) (C) không đi qua điểm $A(1 ; 1)$.

13. Phương trình tiếp tuyến tại điểm $M(3 ; 4)$ với đường tròn $(C) : x^2 + y^2 - 2x - 4y - 3 = 0$ là :

(A) $x + y - 7 = 0$; (B) $x + y + 7 = 0$;

(C) $x - y - 7 = 0$; (D) $x + y - 3 = 0$.

14. Cho đường tròn $(C) : x^2 + y^2 - 4x - 2y = 0$ và đường thẳng $\Delta : x + 2y + 1 = 0$.

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

(A) Δ đi qua tâm của (C) ; (B) Δ cắt (C) tại hai điểm ;

(C) Δ tiếp xúc với (C) ; (D) Δ không có điểm chung với (C).

15. Đường tròn $(C) : x^2 + y^2 - x + y - 1 = 0$ có tâm I và bán kính R là :

(A) $I(-1 ; 1), R = 1$; (B) $I\left(\frac{1}{2} ; -\frac{1}{2}\right), R = \frac{\sqrt{6}}{2}$;

(C) $I\left(-\frac{1}{2} ; \frac{1}{2}\right), R = \frac{\sqrt{6}}{2}$; (D) $I(1 ; -1), R = \sqrt{6}$.

16. Với giá trị nào của m thì phương trình sau đây là phương trình của đường tròn $x^2 + y^2 - 2(m + 2)x + 4my + 19m - 6 = 0$?

(A) $1 < m < 2$; (B) $-2 \le m \le 1$;

(C) $m < 1$ hoặc $m > 2$; (D) $m < -2$ hoặc $m > 1$.

17. Đường thẳng $\Delta : 4x + 3y + m = 0$ tiếp xúc với đường tròn $(C) : x^2 + y^2 = 1$ khi :

(A) $m = 3$; (B) $m = 5$;

(C) $m = 1$; (D) $m = 0$.

http://sachviet.edu.vn

18. Cho hai điểm $A(1 ; 1)$ và $B(7 ; 5)$. Phương trình đường tròn đường kính AB là :

(A) $x^2 + y^2 + 8x + 6y + 12 = 0$;

(B) $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 12 = 0$;

(C) $x^2 + y^2 - 8x - 6y - 12 = 0$;

(D) $x^2 + y^2 + 8x + 6y - 12 = 0$.

19. Đường tròn đi qua ba điểm $A(0 ; 2)$, $B(-2 ; 0)$ và $C(2 ; 0)$ có phương trình là :

(A) $x^2 + y^2 = 8$;

(B) $x^2 + y^2 + 2x + 4 = 0$;

(C) $x^2 + y^2 - 2x - 8 = 0$;

(D) $x^2 + y^2 - 4 = 0$.

20. Cho điểm $M(0 ; 4)$ và đường tròn (C) có phương trình $x^2 + y^2 - 8x - 6y + 21 = 0$.

Tìm phát biểu đúng trong các phát biểu sau :

(A) M nằm ngoài (C) ;

(B) M nằm trên (C) ;

(C) M nằm trong (C) ;

(D) M trùng với tâm của (C).

21. Cho elip (E) : $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ và cho các mệnh đề :

(I) (E) có các tiêu điểm $F_1(-4 ; 0)$ và $F_2(4 ; 0)$;

(II) (E) có tỉ số $\frac{c}{a} = \frac{4}{5}$;

(III) (E) có đỉnh $A_1(-5 ; 0)$;

(IV) (E) có độ dài trục nhỏ bằng 3.

Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau :

(A) (I) và (II) ;

(B) (II) và (III) ;

(C) (I) và (III) ;

(D) (IV) và (I).

http://sachviet.edu.vn

22. Phương trình chính tắc của elip có hai đỉnh là $(-3 ; 0)$, $(3 ; 0)$ và hai tiêu điểm là $(-1 ; 0)$, $(1 ; 0)$ là :

(A) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{1}=1$;

(B) $\frac{x^2}{8}+\frac{y^2}{9}=1$;

(C) $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{8}=1$;

(D) $\frac{x^2}{1}+\frac{y^2}{9}=1$.

23. Cho elip $(E) : x^2 + 4y^2 = 1$ và cho các mệnh đề :

(I) (E) có trục lớn bằng 1 ;

(II) (E) có trục nhỏ bằng 4 ;

(III) (E) có tiêu điểm $F_1\left(0 ; \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$;

(IV) (E) có tiêu cự bằng $\sqrt{3}$.

Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau :

(A) (I) ;

(B) (II) và (IV) ;

(C) (I) và (III) ;

(D) (IV).

24. Dây cung của elip $(E) : \frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1$ $(0 < b < a)$ vuông góc với trục lớn tại tiêu điểm có độ dài là :

(A) $\frac{2c^2}{a}$;

(B) $\frac{2b^2}{a}$;

(C) $\frac{2a^2}{c}$;

(D) $\frac{a^2}{c}$.

25. Một elip có trục lớn bằng 26, tỉ số $\frac{c}{a}=\frac{12}{13}$. Trục nhỏ của elip bằng bao nhiêu ?

(A) 5 ; (B) 10 ; (C) 12 ; (D) 24.

26. Cho elip $(E) : 4x^2 + 9y^2 = 36$. Tìm mệnh đề sai trong các mệnh đề sau :

(A) (E) có trục lớn bằng 6 ;

(B) (E) có trục nhỏ bằng 4 ;

(C) (E) có tiêu cự bằng $\sqrt{5}$;

(D) (E) có tỉ số $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{5}}{3}$.

http://sachviet.edu.vn

27. Cho đường tròn (C) tâm F_1 bán kính $2a$ và một điểm F_2 ở bên trong của (C).

Tập hợp tâm M của các đường tròn (C') thay đổi nhưng luôn đi qua F_2 và tiếp xúc với (C) (h.3.29) là đường nào sau đây ?



Hình 3.29

(A) Đường thẳng ; (B) Đường tròn ;

(C) Elip ; (D) Parabol.

28. Khi cho t thay đổi, điểm $M(5\cos t ; 4\sin t)$ di động trên đường nào sau đây ?

(A) Elip ; (B) Đường thẳng ;

(C) Parabol ; (D) Đường tròn.

29. Cho elip $(E) : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ $(0 < b < a)$. Gọi F_1, F_2 là hai tiêu điểm và cho điểm $M(0 ; -b)$. Giá trị nào sau đây bằng giá trị của biểu thức $MF_1.MF_2 - OM^2$?

(A) c^2 ; (B) $2a^2$; (C) $2b^2$; (D) $a^2 - b^2$.

30. Cho elip $(E) : \frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ và đường thẳng $\Delta : y + 3 = 0$.

Tích các khoảng cách từ hai tiêu điểm của (E) đến đường thẳng Δ bằng giá trị nào sau đây :

(A) 16 ; (B) 9 ; (C) 81 ; (D) 7.

http://sachviet.edu.vn

ÔN TẬP CUỐI NĂM

1. Cho hai vectơ $\vec{a}$ và $\vec{b}$ có $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=5$, $(\vec{a},\vec{b})=120^{\circ}$. Với giá trị nào của m thì hai vectơ $\vec{a}+m\vec{b}$ và $\vec{a}-m\vec{b}$ vuông góc với nhau ?

2. Cho tam giác ABC và hai điểm M, N sao cho $\overrightarrow{AM}=\alpha\overrightarrow{AB}$; $\overrightarrow{AN}=\beta\overrightarrow{AC}$.

a) Hãy vẽ M, N khi $\alpha=\frac{2}{3}$; $\beta=-\frac{2}{3}$.

b) Hãy tìm mối liên hệ giữa α và β để MN song song với BC.

http://sachviet.edu.vn

3. Cho tam giác đều ABC cạnh a.

a) Cho M là một điểm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Tính $MA^2 + MB^2 + MC^2$ theo a ;

b) Cho đường thẳng d tuỳ ý, tìm điểm N trên đường thẳng d sao cho $NA^2 + NB^2 + NC^2$ nhỏ nhất.

4. Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 6 cm. Một điểm M nằm trên cạnh BC sao cho $BM = 2$ cm.

a) Tính độ dài của đoạn thẳng AM và tính côsin của góc $\widehat{BAM}$;

b) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABM ;

c) Tính độ dài đường trung tuyến vẽ từ đỉnh C của tam giác ACM ;

d) Tính diện tích tam giác ABM.

5. Chứng minh rằng trong mọi tam giác ABC ta đều có

a) $a = b\cos C + c\cos B$;

b) $\sin A = \sin B\cos C + \sin C\cos B$;

c) $h_a = 2R\sin B\sin C$.

6. Cho các điểm $A(2 ; 3)$, $B(9 ; 4)$, $M(5 ; y)$ và $P(x ; 2)$.

a) Tìm y để tam giác AMB vuông tại M ;

b) Tìm x để ba điểm A, P và B thẳng hàng.

7. Cho tam giác ABC với H là trực tâm. Biết phương trình của đường thẳng AB, BH và AH lần lượt là $4x + y - 12 = 0$, $5x - 4y - 15 = 0$ và $2x + 2y - 9 = 0$.

Hãy viết phương trình hai đường thẳng chứa hai cạnh còn lại và đường cao thứ ba.

8. Lập phương trình đường tròn có tâm nằm trên đường thẳng $\Delta : 4x + 3y - 2 = 0$ và tiếp xúc với hai đường thẳng

$d_1 : x + y + 4 = 0$ và $d_2 : 7x - y + 4 = 0$.

9. Cho elip (E) có phương trình : $\dfrac{x^2}{100} + \dfrac{y^2}{36} = 1$.

a) Hãy xác định toạ độ các đỉnh, các tiêu điểm của elip (E) và vẽ elip đó ;

b) Qua tiêu điểm của elip dựng đường thẳng song song với Oy và cắt elip tại hai điểm M và N. Tính độ dài đoạn MN.

http://sachviet.edu.vn

HƯỚNG DẪN VÀ ĐÁP SỐ

CHƯƠNG I

§1.

1. a) Đúng ; b) Đúng.

2. a) Các vectơ cùng phương : $\vec{a}$, $\vec{b}$; $\vec{u}$, $\vec{v}$; $\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{w}$ và $\vec{z}$.

b) Các vectơ cùng hướng : $\vec{a}$, $\vec{b}$; $\vec{x}$, $\vec{y}$ và $\vec{z}$.

c) Các vectơ ngược hướng : $\vec{u}$, $\vec{v}$; $\vec{w}$, $\vec{x}$; $\vec{w}$, $\vec{y}$; $\vec{w}$, $\vec{z}$.

d) Các vectơ bằng nhau : $\vec{x}$, $\vec{y}$.

4. a) Các vectơ cùng phương với $\overrightarrow{OA}$: $\overrightarrow{DA}$, $\overrightarrow{AD}$, $\overrightarrow{BC}$, $\overrightarrow{CB}$, $\overrightarrow{AO}$, $\overrightarrow{OD}$, $\overrightarrow{DO}$, $\overrightarrow{FE}$, $\overrightarrow{EF}$

b) Các vectơ bằng $\overrightarrow{AB}$: $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{ED}$, $\overrightarrow{FO}$.

§2.

5. $|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{BC}|=a$, $|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{BC}|=a\sqrt{3}$.

7. a) Nếu $\vec{a}$, $\vec{b}$ cùng hướng ; b) Nếu giá của $\vec{a}$ và $\vec{b}$ vuông góc.

8. $\vec{a}$, $\vec{b}$ có cùng độ dài và ngược hướng.

10. $\overrightarrow{F_3}$ có cường độ là $100\sqrt{3}$ N, ngược hướng với $\overrightarrow{ME}$, trong đó E là đỉnh của hình bình hành $MAEB$.

§3.

2. $\overrightarrow{AB}=\frac{2}{3}(\vec{u}-\vec{v})$; $\overrightarrow{BC}=\frac{2}{3}\vec{u}+\frac{4}{3}\vec{v}$; $\overrightarrow{CA}=-\frac{4}{3}\vec{u}-\frac{2}{3}\vec{v}$.

3. $\overrightarrow{AM}=-\frac{1}{2}\vec{u}+\frac{3}{2}\vec{v}$.

6. K là điểm thuộc đoạn AB mà $\frac{KA}{KB}=\frac{2}{3}$.

7. M là trung điểm của trung tuyến CC'.

§4.

1. $\overrightarrow{AB}=3$, $\overrightarrow{MN}=-5$; $\overrightarrow{AB}$ và $\overrightarrow{MN}$ ngược hướng.

2. a) đúng b) đúng c) sai d) đúng.

3. $\vec{a}=(2\,;0)$, $\vec{b}=(0\,;-3)$, $\vec{c}=(3\,;-4)$, $\vec{d}=(0{,}2\,;\sqrt{3})$.

4. a), b), c) đều đúng, d) sai.

5. $A(x_0\,;-y_0)$; $B(-x_0\,;y_0)$; $C(-x_0\,;-y_0)$.

6. $D(0\,;-5)$ **7.** $A(8\,;1)$, $B(-4\,;-5)$, $C(-4\,;7)$. **8.** $\vec{c}=2\vec{a}+\vec{b}$.

ÔN TẬP CHƯƠNG I

1. Các vectơ cần tìm : $\overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{FO}$, $\overrightarrow{ED}$.

2. Các khẳng định đúng : a), b) và d).

http://sachviet.edu.vn

3. $ABCD$ là hình thoi.

5. M, N, P lần lượt là các điểm đối xứng với C, A, B qua tâm O.

6. a) $|\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AC}|=a\sqrt{3}$ b) $|\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AC}|=a$.

8. a) $m=\frac{1}{2}, n=0$; b) $m=-1, n=\frac{1}{2}$; c) $m=-\frac{1}{2}, n=\frac{1}{2}$; d) $m=-\frac{1}{2}, n=1$.

10. Các khẳng định đúng a) và c).

11. a) $\vec{u}=(40;-13)$; b) $\vec{x}=(8;-7)$; c) $k=-2, h=-1$.

12. $m=\frac{2}{5}$. **13.** Khẳng định đúng là c).

CHƯƠNG II

§1.

2. $AK=a\sin 2\alpha$; $OK=a\cos 2\alpha$. **5.** $P=\frac{25}{9}$.

6. $\cos(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BA})=-\frac{\sqrt{2}}{2}$; $\sin(\overrightarrow{AC},\overrightarrow{BD})=1$; $\cos(\overrightarrow{AB},\overrightarrow{CD})=-1$.

§2.

1. $\overrightarrow{AB}.\overrightarrow{AC}=0$; $\overrightarrow{AC}.\overrightarrow{CB}=-a^2$.

2. a) Khi điểm O nằm ngoài đoạn AB ta có $\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}=a.b$.

b) Khi điểm O nằm giữa hai điểm A và B ta có $\overrightarrow{OA}.\overrightarrow{OB}=-a.b$.

3. b) $4R^2$.

4. a) $D\left(\frac{5}{3};0\right)$; b) $\sqrt{10}(2+\sqrt{2})$; c) 5.

5. a) $(\vec{a},\vec{b})=90^o$; b) $(\vec{a},\vec{b})=45^o$; c) $(\vec{a},\vec{b})=150^o$.

7. Toạ độ điểm C cần tìm là : $C(1;2)$ và $C'(-1;2)$.

§3.

1. $\widehat{C}=32^o$; $b\approx 61,06\ cm$; $c\approx 38,15\ cm$; $h_a\approx 32,36$ cm.

2. $\widehat{A}\approx 36^o$; $\widehat{B}\approx 106^o28'$; $\widehat{C}=37^o32'$.

3. $a=11,36$ cm ; $\widehat{B}\approx 37^o48'$; $\widehat{C}=22^o12'$.

4. $S=31,3$ dvdt.

5. $BC=\sqrt{m^2+n^2+mn}$.

6. a) $\widehat{C}=91^o47'$; b) $m_a=10,89$ cm.

7. a) Góc lớn nhất là $\widehat{C}\approx 117^o16'$; b) Góc lớn nhất là $\widehat{A}\approx 93^o41'$.

8. $\widehat{A}=40^o$; $b=212,31$ cm ; $c=179,40$ cm

10. 568,457 m.

11. 22,772 m.

http://sachviet.edu.vn

ÔN TẬP CHƯƠNG II

4. $\vec{a}.\vec{b} = -4$.

9. $R = 2\sqrt{3}$.

10. $S = 96$; $h_a = 16$; $R = 10$; $r = 4$; $m_a \approx 17{,}09$.

11. Diện tích S của tam giác lớn nhất khi $\widehat{C} = 90^0$.

CHƯƠNG III

§1.

1. a) $\begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = 1 + 4t \end{cases}$; b) $\begin{cases} x = -2 + t \\ y = 3 - 5t. \end{cases}$

2. a) $3x + y + 23 = 0$; b) $2x + 3y - 7 = 0$.

3. a) $AB : 5x + 2y - 13 = 0$; $BC : x - y - 4 = 0$; $CA : 2x + 5y - 22 = 0$.

b) $AH : x + y - 5 = 0$; $AM : x + y - 5 = 0$.

4. $x - 4y - 4 = 0$.

5. a) d_1 cắt d_2; b) $d_1 // d_2$ c) $d_1 = d_2$.

6. $M_1(4\,;\,4)$, $M_2\left(-\frac{24}{5}\,;\,\frac{-2}{5}\right)$.

7. 45^0.

8. a) $\frac{28}{5}$; b) 3; c) 0.

9. $\frac{44}{13}$.

§2.

1. a) $I(1\,;\,1), R = 2$; b) $I\left(-\frac{1}{2}\,;\,\frac{1}{4}\right), R = 1$; c) $I(2\,;\,-3), R = 4$.

2. a) $(x+2)^2 + (y-3)^2 = 52$; b) $(x+1)^2 + (y-2)^2 = \frac{4}{5}$; c) $(x-4)^2 + (y-3)^2 = 13$.

3. a) $x^2 + y^2 - 6x + y - 1 = 0$; b) $x^2 + y^2 - 4x - 2y - 20 = 0$.

4. $(x-1)^2 + (y-1)^2 = 1$; $(x-5)^2 + (y-5)^2 = 25$.

5. $(x-4)^2 + (y-4)^2 = 16$; $\left(x - \frac{4}{3}\right)^2 + \left(y + \frac{4}{3}\right)^2 = \frac{16}{9}$.

6. a) $I(2\,;\,-4), R = 5$; b) $3x - 4y + 3 = 0$; c) $4x + 3y + 29 = 0$, $4x + 3y - 21 = 0$.

§3.

1. a) $2a = 10, 2b = 6$; $F_1(-4\,;\,0)$, $F_2(4\,;\,0)$; $A_1(-5\,;\,0)$, $A_2(5\,;\,0)$; $B_1(0\,;\,-3)$, $B_2(0\,;\,3)$.

b) $2a = 1, 2b = \frac{2}{3}$; $F_1\left(-\frac{\sqrt{5}}{6}\,;\,0\right)$, $F_2\left(\frac{\sqrt{5}}{6}\,;\,0\right)$; $A_1\left(-\frac{1}{2}\,;\,0\right)$, $A_2\left(\frac{1}{2}\,;\,0\right)$, $B_1\left(0\,;\,-\frac{1}{3}\right)$, $B_2\left(0\,;\,\frac{1}{3}\right)$.

c) $2a = 6, 2b = 4$; $F_1(-\sqrt{5}\,;\,0)$, $F_2(\sqrt{5}\,;\,0)$; $A_1(-3\,;\,0)$, $A_2(3\,;\,0)$; $B_1(0\,;\,-2)$, $B_2(0\,;\,2)$.

2. a) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$; b) $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{16} = 1$.

http://sachviet.edu.vn

3. a) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$; b) $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{1}=1$.

4. $40-20\sqrt{3}\approx 5{,}36$ cm ; $80+40\sqrt{3}\approx 149{,}28$ cm.

5. $MF_1+MF_2=R_1+R_2$.

ÔN TẬP CHƯƠNG III

1. $AB: x+2y-7=0$; $AD: 2x-y-9=0$; $BC: 2x-y+6=0$.

2. $(x+6)^2+(y-5)^2=66$.

3. $5x+3y+2=0$.

4. a) $O'(-2;2)$; b) $M\left(-\frac{2}{3};\frac{4}{3}\right)$.

5. a) $G\left(1;\frac{2}{3}\right)$, $H(13;0)$, $T(-5;1)$; b) $\overrightarrow{TH}=3\overrightarrow{TG}$; c) $(x+5)^2+(y-1)^2=85$.

6. $21x+77y-191=0$; $99x-27y+121=0$.

7. $(x-1)^2+(y-2)^2=36$.

8. a) $\cos(\widehat{\Delta_1,\Delta_2})=\frac{8}{\sqrt{145}}$, $(\widehat{\Delta_1,\Delta_2})\approx 48^o21'59''$; b) $(\widehat{\Delta_1,\Delta_2})=90^o$.

9. $A_1(-4;0)$, $A_2(4;0)$; $B_1(0;-3)$, $B_2(0;3)$; $F_1(-\sqrt{7};0)$, $F_2(\sqrt{7};0)$.

10. 363 517 km ; 405 749 km.

ÔN TẬP CUỐI NĂM

1. $m=\pm\frac{3}{5}$.

2. b) $\alpha=\beta$.

3. a) $2a^2$; b) N là hình chiếu vuông góc của trọng tâm G của tam giác ABC lên d.

4. a) $AM=\sqrt{28}$ cm, $\cos\widehat{BAM}=\frac{5\sqrt{7}}{14}$;

   b) $R=\frac{2\sqrt{21}}{3}$ cm ; c) $\sqrt{19}$ cm ; d) $3\sqrt{3}$ cm^2.

6. a) $y=0$, $y=7$; b) $x=-5$.

7. $AC: 4x+5y-20=0$; $BC: x-y-3=0$; $CH: 3x-12y-1=0$.

8. $(x-2)^2+(y+2)^2=8$; $(x+4)^2+(y-6)^2=18$.

9. a) $A_1(-10;0)$, $A_2(10;0)$; $B_1(0;-6)$, $B_2(0;6)$; $F_1(-8;0)$, $F_2(8;0)$; b) $\frac{36}{5}$

http://sachviet.edu.vn

BẢNG THUẬT NGỮ

B

Bảng giá trị lượng giác của các góc đặc biệt 37
Biểu thức toạ độ của tích vô hướng 43
Bình phương vô hướng của một vectơ 41

C

Công thức Hê-rông 53

D

Diện tích tam giác 53

Đ

Độ dài đại số 21
Điều kiện để ba điểm thẳng hàng 15
Điều kiện để hai vectơ cùng phương 15
Đỉnh của elip 87
Định lí côsin 48
Định lí sin 51
Độ dài của vectơ 6
Đường cônic 89

E

Elip (đường elip) 85

G

Góc giữa hai vectơ 38
Góc giữa hai đường thẳng 78
Gốc toạ độ 21
Giải tam giác 55
Giá của vectơ 5
Giá trị lượng giác của một góc 36

H

Hệ trục toạ độ 21
Hệ số góc của đường thẳng 72
Hiệu của hai vectơ 10
Hệ thức lượng trong tam giác 46
Hoành độ 23

K

Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng 79
Khoảng cách giữa hai điểm 45

M

Mặt phẳng toạ độ 22

N

Nửa đường tròn đơn vị 35

P

Phân tích (biểu thị) một vectơ theo hai vectơ không cùng phương 15
Phương trình chính tắc của elip 86
Phương trình đường tròn 81
Phương trình tiếp tuyến của đường tròn 83
Phương trình đường thẳng theo đoạn chắn 75
Phương trình tổng quát của đường thẳng 74
Phương trình tham số của đường thẳng 71

Q

Quy tắc ba điểm 11
Quy tắc hình bình hành 9

T

Tâm đối xứng của elip 86
Tiêu cự của elip 85
Tiêu điểm của elip 85
Tích của vectơ với một số 14
Tính chất của phép cộng các vectơ 9
Tích vô hướng của hai vectơ 41

http://sachviet.edu.vn

Toạ độ của một điểm 23
Toạ độ của vectơ 22
Toạ độ của trọng tâm tam giác 25
Toạ độ trung điểm của đoạn thẳng 25
Tổng của hai vectơ 8
Trục nhỏ của elip 87
Trục đối xứng của elip 86
Trục hoành 21
Trục lớn của elip 87
Trục toạ độ 20
Trục tung 21
Tung độ 23

V

Vectơ 4
Vectơ đơn vị 6
Vectơ bằng nhau 6
Vectơ cùng hướng 5
Vectơ cùng phương 5
Vectơ chỉ phương của đường thẳng 70
Vectơ đối 10
Vectơ - không 6
Vectơ ngược hướng 5
Vectơ pháp tuyến của đường thẳng 73
Vị trí tương đối của hai đường thẳng 76

Scanned by hocmai.vn

http://sachviet.edu.vn

MỤC LỤC

		Trang
Chương I.	**VECTƠ**	3
	§1. Các định nghĩa	4
	Câu hỏi và bài tập	7
	§2. Tổng và hiệu của hai vectơ	8
	Câu hỏi và bài tập	12
	§3. Tích của vectơ với một số	14
	Câu hỏi và bài tập	17
	§4. Hệ trục toạ độ	20
	Câu hỏi và bài tập	26
	Ôn tập chương I	27
	I. Câu hỏi và bài tập	27
	II. Câu hỏi trắc nghiệm	28
Chương II.	**TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG**	34
	§1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°	35
	Câu hỏi và bài tập	40
	§2. Tích vô hướng của hai vectơ	41
	Câu hỏi và bài tập	45
	§3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác	46
	Câu hỏi và bài tập	59
	Ôn tập chương II	62
	I. Câu hỏi và bài tập	62
	II. Câu hỏi trắc nghiệm	63
Chương III.	**PHƯƠNG PHÁP TOẠ ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG**	69
	§1. Phương trình đường thẳng	70
	Câu hỏi và bài tập	80
	§2. Phương trình đường tròn	81
	Câu hỏi và bài tập	83
	§3. Phương trình đường elip	84
	Câu hỏi và bài tập	88
	Ôn tập chương III	93
	I. Câu hỏi và bài tập	93
	II. Câu hỏi trắc nghiệm	94
	Ôn tập cuối năm	99
	Hướng dẫn và đáp số	101
	Bảng thuật ngữ	105

http://sachviet.edu.vn

Chịu trách nhiệm xuất bản : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc **NGÔ TRẦN ÁI**
Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng biên tập **NGUYỄN QUÝ THAO**

Biên tập lần đầu : **NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN - HOÀNG NGỌC PHƯƠNG**
Biên tập tái bản : **ĐẶNG THỊ BÌNH**
Biên tập kĩ - mĩ thuật : **BÙI NGỌC LAN**
Trình bày bìa : **HÀ TUỆ HƯƠNG**
Sửa bản in : **PHÒNG SỬA BẢN IN** (NXBGD TẠI HÀ NỘI)
Chế bản : **PHÒNG SCĐT** (NXBGD TẠI TP.HCM)

HÌNH HỌC 10 (C)

Mã số: CH002T7

In 70.000 bản (QĐ 06) , khổ 17x24 cm
Tại Xí nghiệp In ACS Việt Nam
Km 10 Phạm Văn Đồng - Kiến Thụy - Hải Phòng
Số in: 140. Số xuất bản: 692-2006/CXB/381-1530/GD
In xong và nộp lưu chiểu tháng 3 năm 2007.

http://sachviet.edu.vn



VƯƠNG MIỆN KIM CƯƠNG
CHẤT LƯỢNG QUỐC TẾ

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10

1. TOÁN HỌC
   - ĐẠI SỐ 10
   - HÌNH HỌC 10
2. VẬT LÍ 10
3. HOÁ HỌC 10
4. SINH HỌC 10
5. NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai)
6. LỊCH SỬ 10
7. ĐỊA LÍ 10
8. TIN HỌC 10
9. CÔNG NGHỆ 10
10. GIÁO DỤC CÔNG DÂN 10
11. NGOẠI NGỮ
    - TIẾNG ANH 10
    - TIẾNG PHÁP 10
    - TIẾNG NGA 10
    - TIẾNG TRUNG QUỐC 10

SÁCH GIÁO KHOA LỚP 10 - NÂNG CAO

Ban Khoa học Tự nhiên :
- TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ 10, HÌNH HỌC 10)
- VẬT LÍ 10
- HOÁ HỌC 10
- SINH HỌC 10

Ban Khoa học Xã hội và Nhân văn :
- NGỮ VĂN 10 (tập một, tập hai)
- LỊCH SỬ 10
- ĐỊA LÍ 10
- NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 10, TIẾNG PHÁP 10, TIẾNG NGA 10, TIẾNG TRUNG QUỐC 10)

Giá: 4.200đ

http://sachviet.edu.vn